

П. В. Серебровский "Результаты орнитологических
наблюдений в Закавказском округе Закавказья
в 1916 г." 1-89.

Новые перья Общества Исполнителей природы Т. 18 в. 2
1925. М.

— 10 —

и чечетки. Кроме голоса и повадок, *Oraegithus* в размерах и окраске имеет некоторые общие черты с чечетками, сверх того, альпийская зона является очень характерным местом обитания также и для чечеток (*Acanthis brevirostris* и некоторые другие). Таким образом у *Oraegithus* и чечеток очень много общего.

Обычно у *Oraegithus pusillus* грудь и бока имеют желтый тон, бледнеющий к брюху. Но в виде исключения, правда, не особенно редкого, этот фон винно-розовый различной у разных птиц интенсивности. Двух таких птиц добыл я в конце июля на горе Цорахуль-Эмир. Обе птички были очень жирны. Жир оказался также розовым, кости и даже мышцы имели также особый винно-красный оттенок, словом, вся птица пропитана розовым пигментом¹⁾.

16. *Pyrhula pyrrhula rossikowi*, Derjugin.

Снегирь должен быть на гнездовье в посещенной мною местности, но мне ни разу не встречался. В колл. Зоол. Музея Акад. Наук я видел ♂ ad. от 5/18/III. 99 из Кахи, Закат. окр., сбора Цветкова, относящегося, несомненно, к названному подвиду.

17. *Carpodacus rubicillus rubicillus*, Güld.

Эту прекрасную птичку я встретил в верхней части Сарыбашского ущелья у горы Кара-Кая 7-го июня. Птиц было 6—7 пар; держались неплотной стайкой, по пологой каменистой осыпи, на которой кой-где росла низкая трава. Осыпь эта была уже в альпийской зоне. Горный чечевичник довольно доверчив. Крик его громкий и резкий, напоминает крик клестов (*Loria*), но более приятного, мягкого тембра. Добытые птицы были старые.

18. *Carpodacus erythrinus roseatus*, Hodgs.

В субальпийской зоне Сарыбашского ущелья нередок, но в других местах мне не попадался. Добытые здесь 4 ♂ ad. ad. имеют признаки типичные для указанного подвида.

19. *Fringilla coelebs caucasicus subsp. nova.*

Зяблик в исследуемом районе очень обыкновенен. В повадках и образе жизни существенных отличий от центр.-русского зяблика я не замечал. Уже добытые мною 6 старых птиц показывают довольно заметное отличие в клюве от центр.-русских птиц, именно клювы очень заметно потолще и слегка подлиннее. Вначале я был склонен счесть это явление за следствие близости крымской расы *solomkoi*, отличающейся большим размером клювов, тем более, что 2 экзempl. из Кубани, сбора Птушенко, имеют клювы еще толще, чем у закавказских, почти как у *solomkoi*, являясь, таким образом, как бы переходными между теми и другими. Однако, изучая большие серии зябликов коллекции Зоол. Музея Акад. Наук, где, между прочим, оказалось много экземпляров из Крыма, Кавказа и северной Персии, я пришел к другим выводам: кавказский зяблик, однотипный на всем протяжении Кавказа, отличается довольно ощутимо от восточно-европейского, крымского и персидского. Отличия совершенно не касаются окраски, которая вообще у этих рас одинакова, и заключаются в размерах клюва, крыльев и хвоста; лучше всего они явствуют из приводимой таблицы измерений старых самцов, составленной по обширному материалу различных коллекций (мои сборы, колл. Тифлисского Музея, Симферопольского Музея, колл. П. П. Сушкина, колл. Зоол. Музея Харьковского Университета и колл. Зоол. Музея Академии Наук).

¹⁾ Появление этого пигмента—явление у птиц редкое. Красноватый налет часто можно видеть у нормально белых чаек: *Larus ridibundus*, *Larus minutus* и др., у крохалей: *Mergus merganser* и *M. serrator*. При этом такие птицы, как мне приходилось наблюдать, всегда были жирны. Любопытно, что у *Rhodostethia rosea* это явление стало теперь уже постоянным и относится к числу хороших диагностических признаков этой птицы, хотя интенсивность розовой окраски и здесь индивидуально колеблется в значительных пределах. Быть может, появление этого пигмента стоит в связи с количеством пищи, потому что он наблюдается, как сказано, лишь у особей жирных, хорошо упитанных. Пигмент этот растворим в бензине (и также в других жир-растворяющих соединениях) и сам, повидимому, жирового характера (линохром). См. об этом А. Богданов, Цветность пера птиц, 1858.

	Крыло.	Хвост.	Плюсна.	Длина клюва от лобного оперения.	Длина клюва от ноздри.	Высота клюва на попереч- нике ноздри.
<i>Fring. coelebs coelebs</i>	84—91	64—67	17 —19	11 —11,5	9 —10,4	6,8—7,5
„ „ <i>solomkoi</i>	87—90,5	65—67	18,2—20	12,3—13,3	10,8—11	8,8—9,2
„ „ <i>caucasicus</i>	82—88	62—68,5	17,5—20	11,5—13,4	9,6—10,8	7,3—8,2
„ „ <i>alexandrowi</i>	80—86	58—63	18 —19,7	11,5—12,5	—	7,1—7,5

Таким образом зяблики из северной Персии имеют наименьшую длину крыльев и хвоста, клюв же у них не меньше, чем у типичных, скорее даже чуть крупнее, но никогда не достигает размеров максимальных для кавказских и крымских. Они, повидимому, должны именоваться *Fr. coel. alexandrowi*, Zar. Кавказские отличаются от типичных длиной и высотой клюва, являясь в этом отношении промежуточными между персидскими и европейскими, с одной стороны, и самыми клювастыми крымскими—с другой. Имеющих минимальную высоту клюва можно смешивать с типичными, имеющими максимальную для последних высоту, но крайности встречаются редко, если не считать молодых. Зимой на Кавказе (северном и южном), равно как и в Крыму, встречаются в большом количестве типичные зяблики; едва ли даже не чаще, чем местные. Экземп. № 1-й моих сборов в Закавказьи, ♂ от 14/VI, имеет высоту клюва равную всего только 6,8, что не только не встречается у кавказских, но даже у европейских бывает лишь как minimum. Если это не первогодок, то, очевидно, зимовавший, из более северных мест, т. е. типичный *coelebs*. Размеры кубанских птиц (к сожалению, только 2 экз.!) оказались близ maximum'a для кавказской расы—высота клюва 8 и 8,2. Очевидно, результат соседства с *solomkot* ¹⁾.

Диагноз: *Fringilla coelebs caucasica* subsp. nova, subspeciei *F. c. coelebs simillima*, sed rostro majore, nunquam tamen tantum, quantum *F. c. solomkoi* Menzb. et Suschk. Terra typica—Caucasus. Typus № 3 ♂ ad. 17. IV. 916 Sakataly, Transcaucasia, in coll. M. A. Menzbieri.

20. *Fringilla coelebs coelebs*, L.

Как уже указывалось выше, зимует на Кавказе, при чем в Предкавказье (Кубанск. область, мои случайные наблюдения) вытерпывает лютую стужу—около—15°C. при сильном ветре.

21. *Montifringilla alpicola alpicola*, Pall.

Мне эта птица не встретилась, очевидно случайно, потому что в колл. Зоол. Муз. Академии Наук я видел экз. ♂ ad. от 21, VI. 903 из окр. Сарыбаша сбора Цветкова.

22. *Passer domesticus caucasicus*, Bogd.

Воробей обыкновенен в посещенной местности. Систематическое положение кавказских воробьев не вполне выяснено. Различные авторы или считают их за типичных, или за переходных к *P. d. indicus*, Jard. & Selby, или, наконец, за самостоятельный подвид *P. d. caucasicus*, Bogd. Добытых мною 4-х старых птиц (3 ♂ и 1 ♀) из окр. Закатал я сравни-

¹⁾ Крымского зяблика, *Fr. c. solomkoi*, описанного двумя известнейшими орнитологами, Hartert сгруппированным образом вносит в список палеарктических птиц не за помером, а, наоборот, с двумя знаками вопроса (см. 20, Zusätze, p. 2062). Этому нельзя не удивляться, в особенности после того, как Hartert внес без дальнейших рассуждений в тот же список целый ряд наскоро, иногда по 2—3 экземплярам, сфабрикованных различными как известными, так и неизвестными авторами подвидов. Зябликов я исследовал много, и думаю, что крымского *solomkoi* можно без большого риска ошибиться отличать по клюву, закрыв глаза, наощупь.