

БИБЛИОТЕКА
Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВА

ИЗВѢСТІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ,
АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ.

Томъ VIII. выпускъ 2.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ

ТУРКЕСТАНСКИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Н. А. СЪВЕРЦОВА.

ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА.

подъ редакціей А. П. Федченко и Л. П. Сабанъева.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К°),
на Страстномъ бульварѣ.

1873.

158 стр

ными поперечными, рыжими полосками на каждом перье; слѣд. цвѣтрасположеніе сходно, но у нормальных *F. aesalon* сѣро-буроватый цвѣтъ преобладаетъ надъ рыжимъ, у *F. alaudarius* наоборотъ.

Самецъ *F. alaudarius*, добытый зимой 1866 у Чимкента, нѣсколько сѣрѣе самки; наствольныя пятна на груди немного шире; вообще цвѣтъ ближе къ молодымъ *F. aesalon*, но ростъ малъ. Длина 12" 3", размахъ 24" 7"; длина молодого *F. aesalon*, самца 13", размахъ 24" 6".

По этимъ даннымъ еще нельзя рѣшить, есть ли *F. alaudarius* особый видъ, или видоизмѣненіе *F. aesalon*; нужно болѣе экземпляровъ, во всѣхъ возрастахъ, тѣмъ болѣе что мои экземпляры къ сожалѣнію добыты не при мнѣ, такъ что я не могъ опредѣлить ихъ возраста посредствомъ вскрытія и осмотра зрѣлости половыхъ органовъ. Вѣроятно впрочемъ къ этому же виду или видоизмѣненію относится малорослый *F. aesalon*, старый самецъ, добытый на Иртышѣ 16-го апрѣля 1864 г., при весеннемъ пролетѣ: длина 12" 1", размахъ 25", крыло 8" 5", хвостъ 5", плюсно 13", средний палецъ 14", клювъ 7". Относительно цвѣта отличается рыжимъ затылкомъ, съ бѣловатыми концами перьевъ, очень мелкими наствольными пятнами на груди и брюхѣ и рыжими ободками всѣхъ голубовато-пенельныхъ перьевъ головы, спины, плечъ и кроющихъ крыло; рулевые съ ясными черноватыми поперечными полосками.

33. 34. *Strigiceps cyaneus* и *S. pallidus*. Приводимые орнитологами отличительныя признаки этихъ видовъ весьма близкихъ видовъ и нашелъ вообще непостоянными, кромѣ различій во второй одеждѣ самцовъ; почему долго считалъ ихъ за видоизмѣненія, какъ объяснено въ моемъ трудѣ о періодическихъ явленіяхъ животной жизни въ Воронежской губерніи. Однако, при внимательномъ сравнительномъ изученіи многихъ десятковъ экземпляровъ всякаго возраста и пола, я наконецъ нашелъ безошибочный отличительный признакъ, именно цвѣтъ надхвостья. *)

У *S. cyaneus* оно бѣлое безъ пятенъ, или съ нижними наствольными полосками.

У *S. pallidus* оно тоже бѣлое но, кромѣ весьма ясныхъ наствольныхъ полосъ, есть еще темныя поперечныя, широкія и рѣзкія, сѣрыя у взрослыхъ самоцовъ, бурныя у самокъ и молодыхъ.

Этотъ признакъ отличителенъ для обоихъ половъ и всѣхъ возрастовъ.

38. *Athene orientalis* отъ европейской *A. noctua* отличается тѣмъ, что бурый цвѣтъ послѣдней у *A.*

*) Также постоянны въ сущности и признаки маховыхъ, указанные Блэзиусомъ, особенно ихъ величина, но относительная длина маховыхъ осенью пелена, когда есть нѣсколько недорослыхъ перьевъ, хотя уже начинающія твердѣть. Тогда *S. pallidus* можетъ показаться такимъ же тупокрылымъ какъ *S. cyaneus*.

orientalis гораздо блѣднѣе, переходитъ въ сѣро-рыжеватый съ желтоватымъ оттенкомъ какъ *A. noctua meridionalis*, отъ которой *A. orientalis* отличается густымъ опереніемъ пальцевъ, кромѣ ногтевого сустава. Пальцы оперены также густо, какъ у *A. (Nyctale) Tengmalmi*, но кромѣ своего темнаго цвѣта, *A. Tengmalmi* отличается ушными отверстіями, полулунными и широкими, во всю выпину черепа, между тѣмъ какъ у *A. orientalis* ушное отверстіе овально и гораздо меньше, въ пол-черепа, какъ у *A. noctua*. По Киргизски *A. orientalis ай-хай*, по крику; тоже *бай-кызъ* (богатая дѣвица).

По соединенію этихъ признаковъ, свѣтлаго цвѣта съ пушистыми пальцами, *A. orientalis* я считаю не видоизмѣненіемъ, а особымъ видомъ.

46. *Corvus subcorax* (*C. umbrinus*? Rüpp., var.? *) Форма совершенно, какъ у *C. corax*, и такой же округленный хвостъ, котораго крайнія перья на 1—1½" короче среднихъ; клювъ и голова пропорціонально немного меньше, однако гораздо крупнѣе, чѣмъ у *C. corone*, къ которой *C. subcorax* приближается ростомъ, но крикъ почти какъ у ворона, отрывистый, а не протяжный; только голосъ не такъ басистъ; наконецъ, длинныя заостренныя горловые перья начинаются отъ самаго клюва, какъ у ворона и постепенно удлиняются къ низу; у вороны длинныя узкія, заостренныя перья съ половины горла внизъ. Длина *C. subcorax* 23" 2", размахъ 42", клювъ 2" 5" — 2" 7", хвостъ 9½".
Длина *C. corone* 21" — 22", размахъ 39 — 42", клювъ 2" 2" — 2" 5" хвостъ 8¼ — 1½".

Длина *C. corax* 26 — 29", размахъ 51 — 55", клювъ 3 — 3½", хвостъ 10" 4" — 11".

Иные экземпляры *C. corone* приближаются къ *C. subcorax*, то крупнымъ клювомъ, то округленнымъ хвостомъ, котораго крайнія перья бывають на 1" короче среднихъ. Но даже при равныхъ размѣрахъ клювъ *C. corone* всегда тоньше, болѣе коническій, и верхняя челюсть не такъ выпукла, какъ у *C. subcorax*, притомъ безошибочный признакъ даютъ горловые перья. Отъ *C. corax* достаточно отличается *C. subcorax* уже своимъ малымъ ростомъ.

Относительная длина переднихъ маховыхъ перьевъ (напр. 3 > 4 > 5 > 2 > 6 и т. д.) и число щитковъ на плюснѣ, въ чемъ я было искалъ отличительныхъ признаковъ для этихъ трехъ, одинаково черныхъ видовъ, у всѣхъ ихъ непостоянны.

61. *Passer ammodendri*, нов. Клювъ пропорціонально меньше чѣмъ у прочихъ воробьевъ, выпуклый; поз-

*) У африканскаго *C. umbrinus* голова, шея и многія перья брюха не черныя, а блестяще-темнобурныя; впрочемъ въ жаркое лѣто 1860 г. я замѣтилъ на нижнемъ Уралѣ побурѣвшія черныя перья и у нашихъ галокъ, и притомъ перья свѣжія. Но хвостъ *C. umbrinus* много короче: 8 англ. д.

Н. А. Северцов
Ветчинины и горюхины. распределение

По этим данным еще нельзя решить, есть ли *F. alaudarius* особый вид или видоизменение *F. aesalon*. Нужно более экземпляров во всех возрастах, тем более что мои экземпляры, к сожалению, добыты не при мне, так что я не мог определить их возраста посредством вскрытия и осмотра зрелости половых органов. Вероятно, впрочем, что к этому же виду или видоизменению относится малорослый *F. aesalon*, старый самец, добытый на Иртыше 16 апреля 1864 г. при весеннем пролете.

Длина 12"1", размах 25", крыло 8"5", хвост 5", плюсно 13", средний палец 14", клюв 7".

Относительно цвета отличается рыжим затылком с беловатыми концами перьев, очень мелкими наствольными пятнами на груди и брюхе и рыжими ободками всех голубовато-пепельных перьев головы, спины, плеч и кроющих крыло; рулевые с ясными черноватыми поперечными полосками.

33. 34. *Strigiceps cyaneus*, *S. pallidus*. Приводимые орнитологами отличительные признаки этих двух весьма близких видов я нашел вообще непостоянными, кроме различий во второй одежде самцов. Поэтому я долго считал их за видоизменения, как объяснено в моем труде о периодических явлениях животной жизни в Воронежской губ.¹ Однако при внимательном сравнительном изучении многих десятков экземпляров всякого возраста и пола, я, наконец, нашел безошибочный отличительный признак, именно цвет надхвостья².

У *S. cyaneus* оно белое без пятен или с нижними наствольными полосками.

У *S. pallidus* оно тоже белое, но, кроме весьма ясных наствольных полос, есть еще темные поперечные, широкие и резкие, серые у взрослых самцов, бурые у самок и молодых.

Этот признак отличителен для обоих полов и всех возрастов.

38. *Athene orientalis*. Отличается от европейских *A. noctua* тем, что бурый цвет последней у *A. orientalis* гораздо бледнее, переходит в серо-рыжеватый с желтоватым оттенком, как у *A. noctua meridionalis*, от которой *A. orientalis* отличается густым оперением пальцев, кроме ногтевого сустава. Пальцы оперены так же густо, как у *A. (Nyctale) Tengmalmi*, но, кроме своего темного цвета, *A. Tengmalmi* отличается ушными отверстиями, полулунными и широкими, во всю высоту черепа, между тем как у *A. orientalis* ушное отверстие овально и гораздо меньше, в пол-черепа, как у *A. noctua*. По-киргизски *A. orientalis* «ай-хай» по крику, тоже «бай-кыз» (богатая девица).

По соединению этих признаков — светлого цвета с пушистыми пальцами, *A. orientalis* я считаю не видоизменением, а особым видом.

46. *Corvus subcorax* (*C. umbrinus*? Rüpp. var.?)³. Форма совершенно, как у *C. corax*, и такой же округленный хвост, крайние перья которого на 1—1½ дм. короче средних. Клюв и голова пропорционально немного меньше, однако гораздо крупнее, чем у *C. corone*, к которой *C. subcorax* приближается ростом, но крик почти как у ворона, отрывистый, а не протяжный; только голос не так басист. Наконец, длинные, заостренные гор-

¹ Н. А. Северцов. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии. М., 1855.

² Также постоянны, в сущности, и признаки маховых, указанные Блазиусом, особенно их выемки, но относительная длина маховых очень неясна, когда есть несколько недоросшие перья, хотя уже начинающие твердеть. Тогда *S. pallidus* может показаться таким же тупокрылым, как *S. cyaneus*.

³ У африканского *C. umbrinus* голова, шея и многие перья брюха не черные, а блестящегтемнобурые; впрочем, в жаркое лето 1860 г. я заметил на нижнем Урале побуревшие черные перья и у наших галок, и притом перья свежие. Но хвост *C. umbrinus* много короче: 8 английских дюймов.