

ПРОВЕРЕНО 1935 г.

ИЗВѢСТІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ,
АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ.


Томъ VIII. выпускъ 2.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ
ТУРКЕСТАНСКИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Н. А. СЪВЕРЦОВА.

ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА.

подъ редакціей А. П. Федченко и Л. П. Сабанѣва.



МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К°),
на Страстномъ бульварѣ

1873.

тельствоваль ихъ относительно защечныхъ мѣшковъ. но *S. tigrinus* между ними не нашель

49. *Meiones* (*Bromomys*) *collum*, Sev. *), есть форма средняя между *M. orimus* и *M. tamariscinus*, ростъ и цвѣтъ послѣдняго и хвостовой пучокъ какъ у первого, хотя иначе окрашенъ и не много меньше. Вотъ сравнительныя диагнозы

M. collum Supra rufescens, nigro-irroratus, apicis pilium nigris suptus albus, cauda corpore concolor, floccosa, bicolor, pilis rufescentis et nigris intermixtis; flocco etiam bicolorie, fuliginoso et canescente; dentes incisores supra unisulcati

M. orimus Supra pallide et sordide fulvescens, fuliginoso irroratus, cauda praeter flocco nigro unicolor, intensius fulva, dentes incisores bisulcati

(*M. lybicus*) Ut *orimus*, sed incisoris unisulcatis

M. tamariscinus Ut *M. collum*, sed flocco caudae paravo, raene distincto, unicolore fuliginosa

У *M. collum* черныи хвостовой пучекъ окруженъ блѣдно-сѣрымъ ободкомъ, котораго волосы не короче черныхъ, длина около 7—8'', хвостъ 6½—7'', добытъ въ предгорьяхъ семирѣчнскаго Алатау, между Коксу и Или и на Каратау; въ послѣдней мѣстности въ юнѣ 1867 молодой который отъ взрослога отличается только меньшимъ ростомъ и пропорционально меньшимъ хвостовымъ пучкомъ.

У *M. orimus*, добытаго во множествѣ на Или, у Ходжента и ниже, у Сыр-Дарьи, отъ хвостоваго пучка иногда поднимается рѣзкая черная полоса, вдоль верхней стороны хвоста почти до его корня, эта полоса весьма измѣнчива въ своей длинѣ

По признакамъ и горному мѣстопребыванію, *M. collum* мнѣ кажется общимъ родоначальникомъ степныхъ *M. tamariscinus* и *M. orimus*, живущихъ на бывшемъ днѣ геологически недавняго моря, какъ и *M. lybicus*, который по зубамъ ближе къ *M. collum*, нежели *orimus*, и, можетъ быть, отѣсненъ послѣднимъ къ Ю. З.

Впрочемъ еще неизвѣстна граница между *M. orimus* и *M. lybicus*, которая должна проходить по пустынямъ Перси или Сири

57 *Lagomys rutilus*, Sev. И лѣтняя, и зимняя шерсть могутъ быть опредѣлены по старому линяющему экземпляру, добытому въ концѣ мая, въ горахъ у Вѣрнаго. Зимняя шерсть довольно длинная, сѣро-желтоватая съ черной примѣсью, начиная съ затылка, корни волосъ темно-свинцовые, въ отличие отъ *L. rufescens*, Gray, ничего бѣлаго на мордѣ, срединѣ шен, брюхѣ и внутренней сторонѣ ногъ; всѣ эти части блѣдно-желтоваты (*fulvescentes*), бока, горло и наружная

сторона ногъ желто-рыжеваты, уши большія, закругленныя, покрыты жесткимъ желтосѣроватымъ волосомъ, усы желтые, съ немногими черными волосами, ногти черны, длина 8½''

Лѣтняя шерсть: весь верхъ тѣла огненно рыжій, горло каштановое

Молодой: верхъ тѣла сѣро-желтоватый, желтѣе чѣмъ у стараго зимняго, лобъ рыжій.

Старый и молодой добыты въ концѣ мая 1867, въ горахъ у Вѣрнаго, на высотѣ 7—8000 фут., еще раньше добытъ, но утраченъ старый и тоже жившій, въ ущельѣ р. Кара-буры, къ Ю отъ Аулие-ата, въ концѣ юня 1864, на высотѣ около 6500 фут., слѣд. южнѣе и ниже чѣмъ у Вѣрнаго, а линялъ мѣсяцомъ позднѣе. Лѣтняя шерсть слѣд. надѣвается различно, отъ половины юня до половины юля. Линяющіе оба пѣтле, съ широкими ровными полями лѣтней яркорыжеи шерсти; у вѣрненскаго, сохраненнаго въ коллекціи (теперь въ московскомъ музеѣ) на теменѣ, горлѣ, бокахъ и спинѣ, у карабуринскаго ярко-рыжихъ поля, помнитса, мельче и многочисленнѣе, у обоихъ совершенно неправильны.

Живеть въ можжевелннкахъ и не отличается осторожностью всѣ 3 экземпляра застрѣлены и стрѣлять приходилось не иначе какъ очень близко.

58. *Lepus Lehmanni*, Sev. Первые экземпляры этого зайца, доставленные Г Леманномъ съ Сыр-Дарьи и восточнаго берега Каспи въ Академію Наукъ были опредѣлены Г Брандтомъ за *L. tolai*, по малому росту и характерическому для послѣдняго узкому черному ободку на ушахъ; но изученіе живыхъ экземпляровъ не подтверждаетъ это опредѣленіе, такъ какъ и складомъ и цвѣтомъ *L. Lehmanni* гораздо ближе къ европейскому *L. timidus*, нежели къ *L. tolai*, представляя между этими двумя видами среднюю форму, которая, по постоянству своихъ признаковъ, одинакихъ и у живущихъ въ можжевелннкахъ близъ вѣчныхъ снѣговъ Тянь-шана, и у живущихъ ниже уровня океана на знойномъ каспійскомъ побережьи—можетъ считаться особымъ самостоятельнымъ видомъ

Ростъ малъ, всѣсъ не болѣе 5—6 фунтовъ, длина безъ хвоста 17—18'', уши длиннѣе головы, загнутыя и приложенныя къ мордѣ выдаются впередъ на 6—7'' и даже почти на 1'', хвостъ одной длины съ головой, или очень мало короче; вытянутыя заднія ноги вдвое длиннѣе переднихъ и нѣсколько длиннѣе туловища отъ плечъ до хвоста.—Такимъ образомъ относительныя размѣры ушей и ногъ одинаковы съ *L. timidus* и его видоизмѣненными (*L. aquilonius*, *L. caspius*)—а хвостъ измѣнчивъ и только иногда короче головы, какъ у *L. tolai*, который отличается болѣе короткими ушами и ногами.

Цвѣтъ совершенно какъ у *L. timidus*, темнѣе и синѣе на желта сѣровато-бурыи; каждый волосъ окрашенъ

*) Названъ первоначально *M. montanus*, такъ и въ каталогахъ стр. 6 и 18, но это имя уже дано Smith'омъ южно-африканскому виду.