

Азии. У нас очень обыкновенна на пролетах, появляясь весной в самом конце марта, а осенью в начале второй половины августа. Встречается до конца октября. В Копет-Даге на гнездовья достоверно не найдена.

Род *Phylloscopus* Boie. Пеночка

Клюв разнообразной формы, то большой, как у камышевок, то тонкий. Щетинки у его основания развиты хорошо. Сгиб крыла и подмышечные серно-желтые. Питаются насекомыми. Гнезда строят на земле или низко над ней, шаровидной формы. Яиц 5—7, беловатых с красно-бурыми точками и пятнышками.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДА *PHYLLOSCOPUS*

- 1 (8). На крыле нет светлых поперечных полос см. 2
- 2 (3). Наружные опахала 3-го, 4-го и 5-го маховых сужены. Ноги желтовато-буроватые. Низ белый с легким желтоватым налетом на груди.

Пеночка Эверсмманна. *Phylloscopus trochilus eversmanni* (Bp.)

- 3 (2). Наружные опахала 3-го, 4-го, 5-го и 6-го маховых сужены. см. 4
- 4 (7). Ноги черные. см. 5
- 5 (6). Длина крыла 51—55 мм. Верх тела серо-бурый без всякой зеленоватой примеси.

Пеночка серая. *Phylloscopus neglectus* Hume

- 6 (5). Длина крыла 53,1—67 мм. Верх, особенно надхвостье и наружные каемки маховых, с зеленоватым оттенком.

Пеночка теньковка. *Phylloscopus collybita* Vieill

- 7 (4). Ноги желто-буроватые. Низ тела темно-желтый.

Пеночка индийская. *Phylloscopus griseolus* Blyth

- 8 (1). На крыле одна или две светлые поперечные полосы. см. 9
- 9 (10). Темя одноцветное.

Пеночка желтобрюхая. *Phylloscopus nitidus* Blyth

- 10 (9). По середине темени проходит продольная светлая полоска см. 11
- 11 (12). Подклювье светлое.

Пеночка корольковая. *Phylloscopus occipitalis* (Blyth)

- 12 (11). Подклювье темное, только основание его светлее.

Зарничка. *Phylloscopus inornatus* Blyth.

Пеночка Эверсмманна. *Phylloscopus trochilus eversmanni* (Bp.)

Верх оливково-серого цвета с более сероватым надхвостьем. Надбровные полосы светло-желтые, не ясны. Низ белый с оливко-

во-серым налетом на груди и боках с желтоватым налетом на передней стороне шеи и груди. Подмышечные и нижние кроющие крыла желтые. Маховые и рулевые серовато-бурые с сероватыми краями наружных опахал.

В осеннем наряде верх получает желтовато-зеленоватый оттенок, низ более густой желтый. Клюв темно-бурый с желтоватым основанием подклювья. Ноги желто-буроватые.

Крыло 64—72 мм.

Встречается в лесной области Сибири к востоку до Вилюя. В Туркмении бывает только на пролетах, главным образом в западных ее частях.

Пеночка серая. *Phylloscopus neglectus* Hume.

Верх тела светлый серо-буроватый. Надбровные полосы желтоватые, уздечка и перья за глазом черновато-серые. Маховые и рулевые черновато-серые со светлыми каемками наружных опахал. Низ беловатый; грудь и бока брюшка с желто-буроватым налетом; на боках шеи слабый розовато-желтый оттенок. Подмышечные и нижние кроющие крыла белые с желтоватым налетом. Ноги почти черные. Клюв черный с более светлым основанием подклювья.

Крыло 51—55 мм.

Вырезка на 6-м маховом иногда не явственна. 2-е маховое равно 8-му, 9-му или даже 10-му.

Зарудный указывает эту птичку гнездящейся в значительном числе в полосе арчевых лесов верхней зоны Копет-Дага. Мне она известна на гнездовьях в хр. Кугитан.

Пеночка теньковка. *Phylloscopus collybita* Vieill.

Этот вид встречается в Туркмении в трех подвидах, которых можно различать друг от друга следующим образом:

- 1 (2). Низ тела с серно-желтыми продольными полосками.

Phylloscopus collybita abietina (Nilss.)

- 2 (1). Низ тела окрашен более равномерно в беловатый цвет с желтовато-буроватым налетом на боках груди, но без желтых продольных полосок.
- 3 (4). Верхняя сторона оливково-серо-буроватая. Нижняя беловатая с легким желтовато-буроватым налетом на боках шеи, на груди и боках тела.

Phylloscopus collybita menzbieri subsp. nov.

- 4 (3). Верхняя сторона оливково-желтовато-буроватая. Нижняя беловатая с более темным розовато-бурым налетом.

Phylloscopus collybita fulvescens Se v.

Phylloscopus collybita abietina (Nilss.) имеет верх тела буровато-серый с продольными зеленоватыми полосками, придающими всей поверхности зеленоватый оттенок, наиболее явственный в надхвостье. Надбровная полоска довольно слабая, желтоватая. Низ грязновато-белый с буроватым налетом на груди и боках, покрыт серно-желтыми продольными полосками. Сгиб крыла, подмышечные и нижние кроющие яркого серо-желтого цвета. Маховые и рулевые черновато-

серые с узкими зелеными каемками. Осенью верх с серовато-буроватым оттенком. Клюв темно-бурый. Ноги почти черные.

Крыло 56—67 мм.

Встречается на пролетах по восточному берегу Каспийского моря.

Phylloscopus collybita fulvescens Se v., отличия которой указаны в таблице, не отличается от предыдущей по своим размерам. Распространена в лесной области западной Сибири. У нас очень обычна на пролетах. Весной пролетает с конца марта до последней трети апреля, осенью появляется в конце августа. Небольшая часть птиц остается и на зимовку.

Phylloscopus collybita menzbieri subsp. n. Верх тела оливково-сероватый с едва заметной зеленоватой примесью. Низ беловатый, особенно чистый на середине брюшка и на подхвостьи; бока тела и грудь с буроватым налетом, бока шеи и зоб—с желтовато-буроватым. Каемки на маховых и рулевых несколько бледнее, чем у предыдущей. По цвету сгиба крыла, подмышечных и нижних кроющих крыла не отличается от нее.

По окраске повидимому ближе всего стоит к описанной Зарудным с Памиро-Алая *Ph. s. subsindianus*, но легко отличается крыловой формулой. 2-е маховое лежит обычно между 7-м и 8-м, редко равно 7-у. 3-е, 4-е и 5-е маховые почти равны (4-е чуть длиннее). Вершина 1-го махового отстоит от вершины 2-го на 25—26 мм., иногда и на 23,5. Наружные опахала 3, 4, 5 и 6 маховых с явственными сужениями.

Крыло 53,1—63,6, хвост 43,8—53,5, плюсна 16,8—19,5, клюв 10,6—12,2 мм.

Обычна на гнездовьях в Копет-Даге. В Каракалинском районе она встречается ниже, на северных же склонах только в самых высоких местах гор. Поселяется вблизи воды, в ущельях, и держится в верхних ветвях деревьев. Весной появляется в конце апреля и сейчас же приступает к гнездостроению. Самка, убитая 12/V-30 г. в ущелье Пир-дере, уже насиживала.

Пеночка индийская. *Phylloscopus griseolus* Blyth

Верх тела серо-бурый с более чисто-бурым надхвостьем. Полоса от основания клюва, идущая над глазом и за ним, лимонно-желтая, кзади бледнеющая. Уздечка и ее продолжение за глазом чуть черноватее верхней стороны. Низ темно-желтый с буроватым налетом на боковых частях и лимонно-желтой серединой. Подхвостье бледно-буровато-желтоватое. Маховые и рулевые бурые с сероватыми каемками наружных опахал. Надклювье темно-роговое, подклювье бледно-буроватое. Ноги буровато-желтоватые.

Самка чуть меньше самца, но по окраске сходна.

Крыло ♂ 62—66, ♀ 58—60 мм.

Живет в Средней Азии до Алтая на севере, в Афганистане и Кашмире. У нас обычна на гнездовьях в Карлюкском районе, в зоне арчи Кугитанского хребта.

Пеночка желтобрюхая. *Phylloscopus nitidus* Blyth

Встречается у нас в трех формах.

- 1 (2). Верхняя сторона травяно-зеленая, нижняя желтая. Крыло 60—66 мм.

Желтобрюхая пеночка. *Phylloscopus nitidus nitidus* Blyth

- 2 (1). Верхняя сторона светло-буровато-оливково-зеленая, нижняя беловатая, с слабым охристо-желтым налетом. см. 3
3 (4). Крыло 57—65 мм. На нем одна светлая поперечная полоска.

Зеленая пеночка. *Phylloscopus nitidus viridanus* Blyth

- 4 (3). Крыло 55—62 мм. На крыле полоска желтая, выше ее находится более слабая вторая.

Phylloscopus nitidus plumbeitarsus Swinh.

У типичной желтобрюхой пеночки *Ph. n. nitidus* Blyth 2-е маховое короче 7-го или 8-го, иногда равно 9-му. Уздечка и продолжение ее за глазом оливковые. Надбровные полосы очень явственные, серно-желтые. Кроющие перья крыльев с желтоватыми концами, образующими поперек крыла явственную полосу, а иногда и вторую—выше, не явственную. Маховые и рулевые бурые с травяно-зелеными каемками. Наклювье темно-бурое, подклювье светлее. Ноги буровато-серые.

Крыло 60—66 мм.

Встречается в Крыму, на Кавказе и в Бухаре. По Зарудному обычна на гнездовьях как в Копет-Даге, так и на равнинах—в подгорных, и в долинах Теджена и Мургаба. Я наблюдал ее только на весеннем пролете, начинающемся в первых числах апреля и на осеннем—в течение сентября.

У зеленой пеночки *Ph. n. viridanus* Blyth верх тела более зеленоват только в надхвостьи. Уздечка немного темнее верха. Надбровные полосы светло-охристо-желтые. Кроющие крыла темно-бурые с широкими оливково-зелеными каймами; большие—с беловатыми кончиками, образующими полосу. Маховые и рулевые с узкими оливково-зелеными каемками. Клюв темно-бурый с светлым основанием подклювья. Ноги аспидно-серые.

Гнездится в европейской части Союза, западной Сибири и в горах Средней Азии. У нас встречается исключительно на пролетах.

Третья форма *Ph. n. plumbeitarsus* Swinh. очень похожа на зеленую пеночку и ее отличия указаны в таблице. Гнездится в Восточной Сибири. У нас изредка встречается в долине Аму-Дарьи как залетная птица.

Пеночка корольковая. *Phylloscopus occipitalis* (Blyth)

Верх тела травяно-зеленый, светлеющий к надхвостью. Голова сверху серовато-зеленая, посередине с продольной желтовато-белой полосой. Яркие надбровные полосы зеленовато-желтые. Низ серовато-белый с легким оливково-зеленым налетом на боках шеи и туловища и зеленовато-желтыми продольными пятнами на горле, груди и брюшке.

Сгиб крыла, подмышечные и нижние кроющие яркого зелено-желтого цвета. Маховые и рулевые черновато-бурые с узкими травяно-зелеными каемками. На крыльях две явственные светло-зеленые полосы.

Крыло 61—67 мм.

На гнездовьях распространена в южной части Средней Азии. У нас возможна, как залетная птица, в восточных частях страны.

T. S. S. R.
THE PEOPLE'S COMMISSARIAT FOR EDUCATION
ZOOLOGICAL STATION
FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN TURKOMANIA

K E Y S
TO
VERTEBRATA OF TURKOMANIA

ISSUE IV

A V E S

By E. L. SHESTOPEROV

(With 15 tables of figure)

НАРКОМПРОС Т.С.С.Р.
ТУРКМЕНСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
ТУРКМЕНСКОЙ ССР

(РЫБЫ, АМФИБИИ, РЕПТИЛИИ, ПТИЦЫ, МЛЕКОПИТАЮЩИЕ)


Под редакцией проф. М. К. ЛАПТЕВА

ВЫПУСК IV

П Т И Ц Ы
AVES

Е. Л. ШЕСТОПЕРОВ

(с 15 таблицами рисунков)



Ашхабад - 1937 - Баку

300с.