

FAUNA MOSQUENSIS.

ОПЫТЪ ОПИСАНІЯ ФАУНЫ

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Томъ первый.

МЛЕКОПИТАЮЩІЯ

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

С. И. Огнева.

Часть первая.

CHIROPTERA. INSECTIVORA. RODENTIA.

ИЗДАНИЕ

Комисіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи,

состоящей при зоологическомъ отдѣленіи

Императорскаго О-ва Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи.


Подъ редакціей профессора Московскаго Университета

Г. А. Кожевникова.

Издано на проценты съ неприкосновеннаго капитала, пожертвованнаго въ память

Неофита Васильевича Калужскаго

ЕГО НАСЛѢДНИКАМИ.



МОСКВА — 1913.

Окраска четвертого экземпляра, добытого Вад. С. Муравьевичемъ 30. IX. 09 г., болѣе темна, такъ какъ землеройка частью получила уже свой зимній мѣхъ. Послѣдній очень длинный и болѣе свѣтлый, чѣмъ зимняя шерсть обычнаго вида. Общій тонъ спины и головы описываемаго экземпляра буровато-сѣрый, съ очень замѣтнымъ палевымъ оттѣнкомъ на концахъ волосъ, основанія коихъ болѣе темнаго сѣраго тона. Вся нижняя сторона покрыта волосами съ довольно темными сѣрыми основаніями и широкими бѣловато-сѣрыми вершинами. Лапы и хвостъ сѣровато-желтые, послѣдній покрытъ длинными свѣтло-буроватыми волосами и замѣтно двуцвѣтный: сверху буроватый, снизу желтоватый. Волосы на хвостѣ неравномѣрной длины: по бокамъ короче, а на концѣ гораздо длиннѣе. Размѣры нашихъ экземпляровъ приведены на стр. 107.

Итакъ, резюмируя все сказанное, мы можемъ видѣть, что байкальская землеройка отличается отъ обычной слѣдующими признаками. Окраска ея значительно свѣтлѣе, чѣмъ у *S. araneus* L.; хвостъ гораздо короче; ступня длиннѣе, чѣмъ у *S. minutus* L.; но короче таковой у *S. araneus* L. Размѣры тѣла мелкіе, далеко уступающіе послѣднему виду. Черепъ по общему строенію напоминаетъ таковой *S. araneus* L., но длина его меньше и носовая область короче. Зубы и отростокъ нижней челюсти, какъ у *S. minutus* L. Въ виду этихъ особенностей я считаю необходимымъ выдѣлить описываемыхъ землероекъ въ особый видъ *Sorex baikalensis* sp. nova.

Очень давно Лахманн (95, р. 285—286) описалъ байкальскихъ землероекъ, какъ отдѣльный видъ, но это описаніе было составлено въ такихъ общихъ чертахъ, что уже Pallas (130, р. 135—136) затруднялся сказать, что представляетъ „*Sorex caecutiens* Lahm., относя это названіе въ синонимы *S. minutus* L. Въ новѣйшее время это дѣлаетъ, правда, съ знакомъ вопроса, Барретъ-Гамильтонъ (16, р. 111).

Мнѣ думается, что проф. Н. Ѳ. Кащенко (80, стр. 93) вполне правъ, причисляя эту землеройку къ группѣ *Sorex araneus* L. или даже *Crocidura* (?), въ виду отношенія ея длиннаго тѣла (79 m/m.) къ очень короткому хвосту (28 m/m.). Тщательно сравнивая своихъ землероекъ съ описаніемъ Лаксмана, я не могъ найти сколько-нибудь совпадающихъ признаковъ, за исключеніемъ только малой длины хвоста. Но это измѣненіе зависитъ отъ суммы различныхъ условій: отъ крайнихъ точекъ промѣра, принятія въ счетъ длины хвоста его конечныхъ волосъ и т. д.

Съ другой стороны, рѣзкая разница въ тѣлѣ животнаго и

Sorex bai

(Всѣ въ кол
М

Длина тѣла (от

Длина хвоста (

Длина ступни п
Длина уха по п

Отъ конца пра
дающагося м
tale magnum

Кондиллярная

Основная длин

Ширина межгл

Наибольшая ш

Отъ задняго кр
до конца пра

несоотвѣтствіе
рѣшеніе причи
диагнозу *S. caeo*
Недавно Old.

горъ, въ 100 м
землеройки *So*
очень легко от
тельно больши
длина черепа:

Важно разс
къ восточно-си

Измѣренія <i>Sorex baikalensis</i> sp. nova. (Всѣ въ коллекціи Зоолог. Музея Моск. Унив.)				
	№ 2710. ♂ Забайкалье, Горный Заренгуй. Ю. Н. Вагнеръ. 1891 г.	№ 2711. ♀ Ibid. 1891 г. Ю. Н. Вагнеръ.	№ 2712. ♂ Ibid. 1891 г. Ю. Н. Вагнеръ.	№ 2709. ♀ Амазаръ (граница Забайкал. и Амурской обл.). 30/IX 909 г. В. С. Муралевичъ.
Длина тѣла (отъ конца носа до anus) . .	43,5	47,5	43,3	43
Длина хвоста (безъ концевыхъ волосъ) .	29,2	25,7	27,2	32,4
Длина ступни передней ноги безъ когтей .	10,6	11,3	10,2	10,7
Длина уха по внѣшнему краю	7	7,5	6,8	6,8
Черепъ.				
Отъ конца praemaxillae до наиболѣе выдающагося мѣста надъ foramen ossipitale magnum		16,5	17,5	16,5
Кондиллярная длина		16,2	17,4	16,2
Основная длина		14,6	15,8	14,6
Ширина межглазничнаго промежутка . .		3,7	3,8	3,8
Наибольшая ширина черепной капсулы .		8,6	8,8	8,8
Отъ задняго края foramen ossip. magnum до конца praemaxillae		4	4,2	3,7

несоотвѣтствіе прочихъ признаковъ сильно поколебали во мнѣ рѣшеніе причислить своихъ землероекъ къ весьма сомнительному диагнозу *S. caecutiens* Laxm. и заставили дать ему новое названіе. Недавно Old. Thomas (195, p. 758) описалъ изъ Саянскихъ горъ, въ 100 миляхъ къ W. отъ Байкальскаго озера, новый видъ землеройки *Sorex centralis* Thom. Судя по описанію, эта форма очень легко отличается отъ *S. baikalensis* sp. nov. своими значительно большими размѣрами. (Длина тѣла и головы: 63 m/m., длина черепа: 19,3.)

Важно разсмотрѣть отношеніе нашей *Sorex baikalensis* sp. nov. къ восточно-сибирской *Sorex buxtoni* Allen. Несмотря на то, что