

и ночью, что имеет большое значение, помогая лучше приспособиться в борьбе за жизнь.

Ю. А. Самородов

Новый подвид *Synthliboramphus antiquus microrhynchos* subsp. nov. (Alcidae, Aves) с Командорских островов. *Synthliboramphus antiquus* всегда рассматривался как монотипический вид (Hartert, 1921—1922; Vaurie, 1965; Check-List of North American Birds, 1957; Бутурлин, 1934; Козлова, 1953, 1957; Дементьев, 1951). За последнее двадцатилетие в фонды Зоологического музея Московского университета¹ поступили новые коллекционные материалы, изучение которых привело к необходимости отказаться от этого взгляда. Среди исследованной серии имелись птицы, добытые в гнездовое время на Командорских островах, на побережье Камчатки и на северном и юго-западном побережьях Охотского моря. При анализе географической изменчивости из рассмотрения были исключены птицы, добытые во внегнездовое время. Половых различий в отношении размеров и окраски у птиц в брачном наряде не обнаруживается. По этой причине при рассмотрении географической изменчивости разделения на половые группы не производилось.

Сравнение птиц из указанных областей показало, что наиболее подвержены изменчивости размеры клюва и рисунок оперения на боках шеи. Эти признаки были взяты в качестве диагностических и на анализе их изменчивости основаны полученные выводы.

Популяции Камчатки и побережий Охотского моря по указанным признакам однотипны. Птицы этих популяций характеризуются крупными размерами клюва и тем, что белые пестрины на боках шеи более широки и многочисленны, отчего испещренность этих партий оперения оказывается более значительной.

Птицам командорской популяции свойственны, напротив, мелкие размеры клюва и иной тип испещренности оперения боков шеи. Пестрины здесь более узки и не так многочисленны, что определяет общую менее значительную развитость всего рисунка.

Размеры птиц командорской популяции и популяций Камчатки и Охотского побережья приведены в таблице. При этом наиболее показательный параметр клюва — его высота. В таблице приводятся данные о высоте клюва, измеренной на границе лобного оперения. Все измерения произведены штангенциркулем и выражены в миллиметрах.

Длина крыла и высота клюва *Synthliboramphus antiquus*

Происхождение материала	Количество экземпляров	Длина крыла			Высота клюва		
		min	max	med	min	max	med
Камчатка и Охотское побережье .	8	138	140	138,8	7,8	8,6	8,2
Командорские острова	5	134	140	137	6,2	7,0	6,4

Анализ различий между птицами Командорских островов, с одной стороны, и птицами Камчатки и Охотского побережья — с другой, приводит к выводу о необходимости таксономического разделения этих популяций и придания им подвидового статуса. В этом отношении положение ясно, но здесь возникает сложный вопрос номенклатурного порядка.

В качестве *terra typica* в первоописании вида указано пространство от запада Северной Америки до Камчатки и Курильских островов. Этим указанием охватывается почти весь ареал вида. Таким образом, без исследования типовых экземпляров, что в настоящее время не представляется возможным, нельзя решить с полной достоверностью вопрос о том, выборка из каких популяций послужила основой для описания и, следовательно, к какой форме привязан старший из имеющихся синонимов. Можно лишь предполагать, что вид был описан по экземплярам широко распространенной крупной формы. В таком случае новое номенклатурное обозначение необходимо для популяции Командорских островов. Но этим еще не исчерпываются номенклатурные осложнения. Существует еще четыре младших синонима (Hartert, 1921—1922). Типовые местности, связанные с этими именами, охватывают Курильские острова, Камчатку,

¹ Кроме того, были использованы материалы некоторых мелких московских коллекций.

Алеутские острова и район Пенжины. Но опять-таки без исследования экземпляров, послуживших основой для описания, нельзя точно установить их популяционную принадлежность, так как в случае, если они были добыты во внегнездовое время, они могли принадлежать любой или почти любой популяции, тем более, что характер кочевков этого вида остается недостаточно изученным. Тем не менее, учитывая очень узкую локализованность и общую малочисленность командорской популяции, можно полагать, что эти описания были сделаны по птицам широко распространенных популяций, населяющих Охотское побережье, Камчатку, Курильские и Алеутские острова и побережье Северной Америки. На основании высказанных соображений, по-видимому, целесообразно старший из имеющихся синонимов относить к крупной форме и считать ее номинальной. Все остальные предложенные имена больше оснований также считать синонимами номинальной формы. Выделяя таксономически популяцию Командорских островов, ее следует номенклатурно обозначить новым именем. Ревизия этой точки зрения будет возможна при исследовании экземпляров, послуживших основанием для упомянутых описаний и добытых 120—180 лет назад. Их современное местонахождение неясно.

Ниже приводятся диагностика и сведения о распространении выделяемых форм.

Synthliboramphus antiquus Gmelin, 1789

Alca antiqua Gmelin, 1789, Syst. Nat. 1, стр. 554 (Ex Pennant, 1784—85, Arctic Zoology, 2, стр. 512, запад Северной Америки до Камчатки и Курильских островов).

Uria senicula Pallas, 1827, Zoogr. Rosso — Asiat., 2, стр. 367, Курилы, Алеуты, Камчатка, Пенжинская губа.

Brachyramphus brachypterus Brandt, Bull. Acad. Petersbourg, 2, стр. 346, Уналашка.

Mergulus cirrhocephalus Vigors, 1839, Zool. Voy. Blossom, Ornith., стр. 32, типовая местность не указана.

Uria cana Kittlitz, 1858, Denkwürd. Reise, 1, стр. 286. Алеутские острова.

Диагноз. Клюв массивный и более высокий; его высота колеблется в пределах 7,8—8,6 мм, в среднем 8,2 мм. Рисунок на боках шеи более развит, белые пестрины многочисленнее и шире.

Распространение. Ареал вида, за исключением Командорских островов.

Synthliboramphus antiquus microrhynchus Stepanyan subsp. nov.

Диагноз. Клюв менее массивный и менее высокий; его высота колеблется в пределах 6,2—7,0 мм, в среднем 6,4 мм. Рисунок на боках шеи развит слабее, белые пестрины более узкие и малочисленные. Исследовано 5 экз.

Голотип. Самец, остров Медный, Командорские острова, 30 июня 1955 г., С. В. Мараков. Высота клюва 6,4 мм, длина крыла 136 мм. Хранится в Зоологическом музее Московского университета, R-81113.

Синтипы. 1. Самка, остров Медный, Командорские острова, 30 июня 1955 г., С. В. Мараков. Высота клюва 6,2 мм; длина крыла 136 мм, R-81112; 2. Самка, остров Беринга, Командорские острова, 18 мая 1913 г., Н. П. Сокольников. Высота клюва 6,3 мм, длина крыла 140 мм, R-24604. Хранятся в Зоологическом музее Московского университета.

Распространение. Командорские острова.

ЛИТЕРАТУРА

- Бутурлин С. А. Полный определитель птиц СССР, т. 1. М., 1934.
Дементьев Г. П. Отряд Чистики. Кн. «Птицы Советского Союза», т. 2. М., «Советская наука», 1951.
Иванов А. И., Козлова Е. В., Портенко Л. А., Тугаринов А. Я. Птицы СССР, ч. 2. М., Изд-во АН СССР, 1953.
Козлова Е. В. Фауна СССР. Птицы, т. 2, вып. 3. М., Изд-во АН СССР, 1957.
Check — List of North American Birds. Fifth Edition. «American Ornithologists' Union», 1957.
Hartert E. Die Vögel der paläarktischen Fauna, Bd. 3. Berlin, 1921—1922.
Vaurie C. The Birds of the Palearctic Fauna. Non Passeriformes. H. F. and G. Witherby Limited, 1965.

Л. С. Степанян

О новом случае залета обыкновенной чечетки в Туркмению. В Туркмении обыкновенная чечетка (*Carduelis flammea flammea*) является редкой случайно залетной птицей, известен лишь один самец, добытый 18 февраля 1914 г. в Гермабе (Дементьев, 1952; Рустамов, 1958).

9 февраля 1962 г. на северо-восточной окраине Ашхабада (с 12 до 14 час) встречено 19 (2, 2, 3, 12) обыкновенных чечеток. 19 марта 1962 г. на такыре в окрестностях колодца Додудыр (Заунгузские Каракумы) найден свежий труп обыкновенной чечетки.

Главное управление
охотничьего хозяйства
и заповедников
при Совете Министров
РСФСР

Министерство высшего
и
среднего специального
образования СССР
и РСФСР

ОРНИТОЛОГИЯ

Выпуск 10

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1972

 X-72