

сохранивших слѣды первого наряда, въ первой трети іюня. *) Съ середины іюня семьи кочующихъ кедровокъ выбираютъ изъ глухихъ мѣстъ, гдѣ онѣ гнѣздились, и начинаютъ кочевать, соединяясь въ стаи штукъ до 20-ти. Облюбовавши кормный уголокъ, птицы держатся тутъ нѣсколько дней, чтобы перебраться куда нибудь по соседству, держатся всегда совместно, совместно же летаютъ въ срединѣ дня на водопой. Благодаря широкому распространенію въ нашихъ лѣсахъ кедр, птицы питаются по преимуществу сѣменами этого растенія.

122. *Perisoreus infaustus* (L.).

Кукша.

Corvus infaustus Linnaeus, l. c., 1758, p. 107; *Perisoreus infaustus sibiricus* (Bodd.), Hartert, l. c., 1903, p. 35 (pt.).

Кукшѣ долины Енисея мы должны причислить именно къ указанной, типичной формѣ, и во всякомъ случаѣ къ стоящимъ гораздо ближе къ таковой, чѣмъ къ болѣе сѣрой и темноголовой восточной *P. i. sibiricus* Bodd. **). Въ тайгѣ отъ широты Красноярска на сѣверъ до полярнаго круга она обыкновенна и въ послѣднемъ пунктѣ еще многочисленна, распространяясь, видимо, и сѣвернѣе, но какъ далеко, остается пока невыясненнымъ. На Колымѣ восточная форма достигаетъ $68^{\circ} 35'$ с. ш. Повидимому, осѣдла во всей занимаемой ею области, развѣ только въ самыхъ сѣверныхъ пунктахъ подвигается зимою южнѣе. Гораздо болѣе, чѣмъ кедровка, придерживается глухой, темной тайги.

Въ виду того, что такой авторитетный писатель, какъ др. Хартертъ, кукшѣ всей Сибири причисляетъ къ *P. i. sibiricus*, а другіе авторы (Дрессеръ, «новый» Науманнъ) кукшѣ всей же Сибири считаютъ за неотличимыхъ отъ европейской *P. infaustus*, считаемъ не лишнимъ категорически указать на ложность *обоихъ* этихъ мнѣній. Передъ нами лежитъ около полусотни экземпляровъ изъ разныхъ мѣстъ и отъ всѣхъ временъ года — изъ бассейновъ Лены, Яны, Индигирки и Колымы, отъ 59° вплоть до $68^{\circ} 31'$ с. ш. Всѣ эти птицы тождественны между собою, а по свидѣтельству Тачановскаго (Faun Orn. Sib. Or., p. 507-508), имѣвшаго матеріалъ именно Колымскаго бассейна (сборъ бар. Майделя) — тождественны и съ птицами Даурии и Сѣ-

*) Молодой отъ 3-VI-1908, Пакулиха, въ первомъ нарядѣ (гнѣздовомъ): чрезвычайно блѣдный, бѣлая наставка верхней стороны всего 1-2 м. м. ширины, все горло бѣлое.

**) См. «Наша Охота» 1908 г., кн. сентябрь, С. Бутурлинъ, «Интересныя находки».

верной Монголіи (Тунка, сборъ Радде *), и всѣ эти наши птицы съ первого взгляда совершенно отличаются отъ европейскихъ чисто сѣрой, безъ охристо-буроватаго налета, спиной и гораздо болѣе сѣрой грудью, и смѣшивать эту настоящую восточно-сибирскую *P. i. sibiricus* съ *P. infaustus* (L.) typic. — невозможно.

Съ другой стороны, кукши, собранныя нами (всего 13 шт.) въ разныхъ частяхъ Енисейской губ., отъ полярнаго круга до южной гористой ея части и къ востоку почти до границъ Иркутской губ., ни по размѣрамъ, ни по окраскѣ совершенно *не отличаются* отъ нашихъ скандинавскихъ экз., но легко отличимы отъ птицъ Лены и сѣв.-вост. Сибири. Сравнивать, разумѣется, нужно птицъ одного сезона и имѣть въ виду — какъ это показываетъ нашъ богатый матеріалъ — что распространеніе рыжаго на маховыхъ и отгѣнокъ шапочки весьма сильно колеблется чисто индивидуально, какъ и отгѣнки рыжаго цвѣта крыла и хвоста.

123. *Garrulus brandti* Eversm.


Сойка рыжеголовая.

Garrulus brandti Eversmann, Add. Pall. Zoogr., 1842, III, p. 8.

Сойка принадлежитъ къ осѣдымъ птицамъ окрестностей Красноярска, гдѣ не рѣдка въ лѣсной мѣстности. Встрѣчается подъ Енисейскомъ, но сѣверная граница на Енисейѣ остается не прослѣженной, никѣмъ изъ изслѣдователей орнитофауны Енисея къ сѣверу отъ Енисейска не указывается, нами лично также не наблюдалась. На востокъ гнѣздится въ Сибири до Сахалина, на западъ — въ лѣсной области юго-западной Сибири и на Уралѣ. На югъ доходитъ до окраины Тибетскаго нагорья. Въ Южно-Уссурийскомъ краѣ замѣняется блѣдной *G. b. ussuriensis* Buturl. На Ленѣ не идетъ къ сѣверу далѣе самыхъ верхнихъ частей бассейна.

*) Это послѣднее указаніе по крайней мѣрѣ въ отношеніи гнѣздящихся въ Монголіи птицъ неправильно. Да и относительно своихъ экз. самъ Радде указываетъ на сильный желтоватый отгѣнокъ спины, чего у *P. i. sibiricus* нѣтъ ни въ какомъ опереніи. Съ другой стороны, экз. Радде, по измѣренію Тачановскаго, имѣетъ хвостъ въ 144 м. м., тогда какъ ни у европейскихъ, ни у енисейскихъ птицъ онъ не бываетъ длиннѣе 140 — и то рѣдко. Равно и пр. Ленбергъ (Ark. f. Zoologi, 1909, Bd. 5 № 9, p. 13.) отмѣчаетъ, что обѣ лѣтнія монгольскія птицы сбора О. Бамберга, походя на шведскихъ, имѣютъ хвосты 148-149 м. м. Въ виду такого постоянства этой монгольской расы можно дать наименование *Perisoreus infaustus caudatus* nov. subsp.

XII
T-81



МАТЕРІАЛЫ
ПО
ПТИЦАМЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ.

А. Я. Тугариновъ и С. Я. Бутурлинъ.

MATERIALIEN

1140 с.

über die Vögel
des Jenisseischen Gouvernements.

von

A. Tugarinow und S. Buturlin.

~~9102~~
КРАСНОЯРСКЪ

Типографія, б. М. И. Абалакова.

1911.