

Ученые Записки

Северо-Кавказского Института
Краеведения, т. I.

Ответственный редактор Д. А. Тарноградский.

Bulletin Scientifique de l'Institut de l'Exploration
Regional du Caucase du Nord, v. I.


Sous la rédaction de D. Tarnogradsky.

Отд. оттиск (Extrait).

Опыт систематического обзора млекопитающих Осетии. (Versuch
einer systematischen Uebersicht der Säugetiere von Ossetien).

С. С. Туров. (S. Turov).

Владикавказ. 1926. Vladicaucase.



48. *Arvicola amphibius meridionalis* Ogn.—Водяная
крыса южная.

По С. И. Огневу (л. с.) добыта на р. Камбилиевке бл. Владикавказа. Кроме того найдена на 9-й версте по Военно-Грузинской дороге (Формозов л. с.)

49. *Arvicola terrestris ognevi* subsp. nov.—Горная
водяная крыса Огнева.

Экз. колл. № 53 самка 14.VII.1925. Гимара, Трусовское ущелье, истоки Терека. № 54—55 самцы 24.IX.1925. № 56 самка 24.IX.1925. с. Калаки, Военно-Осетинская дорога близ Мамисонского перевала, Сев.-Осетия.

Тип № 55 24.IX.1925. с-мц., Калаки, Сев.-Осетия бл. Мамисон. перевала.

В высокогорном районе в окр. с. Калаки, близ Мамисонского перевала, мною были добыты три экземпляра водяных крыс. По первому взгляду на внешний вид, особенно по общей форме вытянутой морды, водяные крысы эти несколько напоминают пасюка, если бы только густой и красиво блестящий мех не отличал их сразу от названного животного. (Я конечно говорю только о внешнем виде, не касаясь признаков характеризующих две различные группы.) Кроме указанных, еще один экземпляр был добыт в истоках Терека близ с. Гимара.

Водяные крысы держатся близ воды, устраивая норы выходящие в воду, также встречаются под громадными камнями по берегу горного потока близ аула Калаки и на ячменных полях в районе этого же селения.

Благодаря любезности С. И. Огнева, который сравнил мои экземпляры с имеющимися в Москве формами, могу привести сравнительное описание моих зверьков.

Окраска взрослых экземпляров не имеет ржаво-бурового тона, как у *M. terrestris rufescens* Sat. ¹⁾ и без густого светло ржавого налета, который отмечает Сатунин для этого подвида. Уши ясно выступают из меха у всех 4-х экземпляров. Сравнение с *A. t. persicus* de Fil. (экземпляр Сатунина, коллекции Зоологического Музея Моск. Университета № 3962 IX.1922. Миозарет, Ардаганский округ, Карской области ²⁾) показало, что мои крысы близки к названной форме, но несколько темнее окрашены несмотря на то, что они светлее других *Arvicola* Кавказа. Окраска хвоста у *A. t. ognevi* значительно темнее, чем у *A. t. persicus*. Хвост последней формы

¹⁾ Материалы к познанию млекопитающих Кавказского Края и Закаспийской области стр. 90.

²⁾ Очевидно тот же экземпляр, который описывает Сатунин в цитируемой работе; см. также Blanford. Eastern Persia. 1876. стр. 61.