

С. И. ОГНЕВ

ЗВЕРИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Т О М

II



1 9 3 1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ГЛАВНАУКА)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

175. *Vulpes vulpes daurica* subsp. nov. Даурская лисица

Место описания типа. Урочище Харангой в 45 км к западу от Троицкосавска (№ 1757, коллекция С. И. Огнева). Кроме типа 4 котина (в коллекции С. И. Огнева).

Диагноз. — Общий тон окраски варьирует от бледного тусклого палево-желтовато-ржавого с некоторой охристостью на лопатках и на средней линии спины до более цветистого с обозначенными охристыми тонами на указанных областях спинной стороны туловища. Подпушь спины весьма пышная желто-буровато-серая. Бока тускло-палево-белесые. Голова в области носа палево-желтовато-охристая и белесая — на лбу. Окраска конечностей варьирует от грязно-палево-ржаво-белесого тона до более охристого. Черный узор на лапках иногда развит, а у некоторых особей совершенно отсутствует.

Хвост бледно-палево-желтоватый с примесью серого оттенка и легкой ржавости у верхнего основания и по дорзальной части.

Череп довольно крупный. Общая длина черепа ♂♂ 146—157,2 мм, ♀ 142,2; кондилобазальная длина ♂♂ 140,7—152,6, ♀ 137,2; ширина скул ♂♂ 73—81, ♀ 70,2; наибольшая ширина черепа ♂♂ 48—49, ♀ 46,3; длина мозговой коробки ♂♂ 59,8—64,2, ♀ 61,2; длина лицевой части ♂♂ 64,8—69,7, ♀ 63; высота черепа ♂♂ 49,1—53,7, ♀ 50,3; длина верхнего ряда зубов ♂♂ 66—71, ♀ 65,2 мм.

Описание. — Общий тон окраски типа (№ 1757) бледный, тусклый палево-желтовато-ржавый, с некоторой охристостью в области лопаток и по средней линии спины (окраска этих частей близка к тону cinnamon). Подпушь темносерая (deer mouse-gray), развитая очень сильно и пышно. Бока тускло-палево-белесые; на груди и животе слабо проступают тусклые буровато-серые основания волос (по тону средние между mouse-gray и quaker-drab), прикрытые белесыми окончаниями остей. Эта лисица — слабо выраженная сиводушка.

Голова бледная палево-желтовато-охристая — в носовой части и белесая — в области лба. Последний признак характерен для даурской лисицы.

Между каждым глазом и концом носа слабо выступает буровато-черноватая полоска. Относительно короткие уши (как у всех средне- и северо-сибирских лис) несут на тыльных внешних частях ярко обозначенный черный узор.

Передние и задние конечности окрашены в грязный палево-ржаво-белесый тон. На фронтальных частях передних лапок нет черных полосок, а замечается только сильная примесь коричневатых волос. Подобные

волосы образуют по небольшому слабо заметному пятну над ступней каждой задней конечности.

Хвост бледно-палево-желтоватый с примесью серого оттенка и легкой ржавости у верхней части основания и по дорзальной поверхности.

Другой экземпляр лисицы моей коллекции (№ 1761, 12/IV 1927 г., урочище Харангой) отличается от описанной заметно большей примесью ржавых тонов в области лопаток и на середине спины (здесь замечается тон *orange-sinnapon*). Эти ржавые тона несколько сильнее выступают и на голове. Подобно предыдущей, — слабо выраженная сиводушка. Окраска паховой области с сильно обозначенным кармино-сероватым оттенком.

Характерна расцветка конечностей. Основной тон их более охристо-ржавый, чем у предыдущей лисицы. На фронтальных частях передних конечностей сильная чернота, которая захватывает широкой полосой область предплечья, пясти и ступни. На задних конечностях — на плюснах и пальцах каждой лапы по яркому черному пятну.

Хвост окрашен, как у предыдущей лисицы, но рыжина на его дорзальной стороне выступает несколько отчетливее.

От № 1761 совершенно неотличима степная забайкальская лисица (№ 4705 КЗММУ) сборов Ф. Ф. Шиллингера. У этой шкурки только отсутствует карминный налет в паховой области. По словам Ф. Ф. Шиллингера, видевшего большие партии степных забайкальских лис, все особи были окрашены довольно однообразно.

Замечу, что к описанному второму типу окраски крайне близка лиса, добытая П. К. Козловым 18/XII 1907 г. близ Кяхты (Усть-Киран).

Систематические заметки. — По общему облику забайкальские степные лисы крайне близки к *V. v. diluta* Ogn. При сравнении некоторых особей этих подвидов между собою их почти невозможно отличить по тону меха. Однако забайкальские лисы сразу узнаются по своему длинному, мягкому меху и по темной, очень пышной подпуши. Так, длина волос средне-спинной области у *V. v. daurica* около 65—70 мм; у *V. v. diluta* около 50 мм.

Далее, для забайкальского подвида характерна белесая окраска лба, — признак, который А. Н. Формозов, видевший много шкурок забайкальских и северо-монгольских лис, считает особенно характерным.

Географическое распространение. — Охватывает собою степи Забайкалья и северной Монголии. Точная область, обитаемая этим характерным животным, однако, не выяснена.