

тен с боков, с блестяще-черным рисунком в виде пятен и полос у задних краев тергитов. 1+2-й тергит в задней половине с полосой, неясно подразделенной на пятна. 3-й и 4-й тергиты в задней трети с округлым срединным пятном и отделенными от него широкими участками налета полосами, заходящими на вентральную сторону. 5-й тергит с единственным округлым срединным пятном в задних 2/5 длины, без следов боковых пятен или полос. Гениталии черные, в густом светлом налете.

♀ неизвестна.

Длина тела 6.5 мм.

Материал. Туркмения: Imam-Baba, distr. Merv (= Mary), 18 V 1912 (Kozsantshikov), 1♂ (голотип). Родендорф (1925, 1930) указал этот экземпляр как "♀".

Этот вид по длинным щупикам и относительно короткому хоботку (его длина лишь в 9 раз превышает высоту у основания подбородка) с хорошо развитыми сосательными лопастями, темной окраске ног и брюшка стоит особняком в роде, напоминая виды рода *Miltogrammoides* Rohd. Некоторое сходство имеется с *P. chorezmi* Rohd. по черному рисунку брюшка и наличию лишь одного пятна на 5-м тергите брюшка.

Pediasiomysia pritykinae Verves, sp.n.

♂. Ширина лба на темени равна 0.32, а лица на уровне основания антенн - 0.29 ширины головы. Лобная полоска посередине лба в 1.3 раза шире орбиты, в 2.3 раза расширена кзади. 3-й членик антенн в 1.5 раза длиннее 2-го; ариста голая, вздута в базальных 2/3 длины. Расстояние от нижнего края антенн до вибриссальных углов равно длине 3-го членика антенн. Лоб в профиль умеренно выступает, ширина скул на уровне основания антенн составляет 0.22, а высота щек - 0.11 высоты глаза (рис.37). Щупики короткие, на конце расширены. Посторбитальных щетинок один правильный ряд; внешние вертикальные щетинки крепкие, вдвое короче внутренних. Глазковый треугольник в многочисленных тонких и коротких светлых волосках, без крепких щетинок. от 1 + 1, крепкие; fr в числе 12-13 пар, средней длины, в передней части лба перекрещиваются. Орбиты, скулы, щеки и задняя часть головы покрыты нежными и короткими желтыми волосками; кроме угловых длинных и черных вибриссальных щетинок, оральные щетинки отсутствуют. Голова полностью в желтовато-белом налете, лобная полоска в передней части желтая, почти без налета. Антенны и щупики желтые, апикальная тонкая часть аристы затемнена. Задняя поверхность головы светло-серая, в желтоватом редком налете.

Кроме более длинных щетинок, грудь покрыта многочисленными тонкими и длинными волосками. ac 2-3 + 2, ac 3 + 4, ia 0 + 2-3, среди всех этих хет только предшовные пары длинные и крепкие, остальные — тонкие, волосовидные и асимметрично расположены. h 2, ph 1, ps 1, sa 2, pa 1, npl 2, $mp1$ 3-4, $ap1$ 0 + 1, hpl очень многочисленные, желтые, волосовидные; бочки груди, кроме щетинок, несут многочисленные тонкие и длинные желтые волоски. Щиток с парой крепких параллельных ar , парой более коротких $subar$, длинными lat и bas и парой a ; его верхняя поверхность покрыта многочисленными короткими черными щетинковидными волосками, а задний край — длинными и тонкими желтыми хетами. 2-5-й членики передних лапок с короткими торчащими черными волосками (рис.38). t_2 с одной ad , кленидий не развит. Костальный шип отсутствует; r_5 замкнута на крае крыла, r_1 и r_{4+5} голые; соотношение длин 3-го и 5-го отрезков кости равно 1 : 1.16, а 2-го и 3-го отрезков медиальной жилки — 1 : 0.25. Изгиб m прямоугольный, без отростка; tr очень слабо дуговидно изогнута, почти прямая; cu с очень коротким отростком. Грудь в светло-сером, слегка желтоватом на спине налете, продольные полосы мезонотума в виде малозаметных узких темных штрихов. Плечевые бугорки и вершина щитка серые. Передние дыхальца серые, задние — желтоватые. Ноги черные, колени желто-коричневые. Крылья прозрачные, базикоста желтая, эполет светло-коричневый, грудная чешуйка белая.

3-й тергит брюшка без срединных маргинальных щетинок, гениталии средних размеров. Брюшко в золотисто-сером налете, с рисунком в виде пятен и полос в задней части тергитов. Срединные пятна черно-бурые, боковые полосы — красно-коричневые, в передней части и на вентральной стороне желто-коричневые. 1+2-й тергит со слабо выраженным рисунком. 3-й и 4-й тергиты в задней трети с округлыми срединными пятнами, отделенными широкими промежутками налета от заходящих на вентральную сторону боковых полосок. 5-й тергит в задней четверти с 3 небольшими округлыми пятнами у середины и неясно выраженными боковыми полосками. Гениталии черные, в светлом налете.

♀ неизвестна.

Длина тела 10.5 мм.

Голотип: ♂, Киргизия, 20 км С Ляйляка, 18 УШ 1969 (Л.Притыкина), хранится в коллекции Зоологического музея Московского университета.

Вид назван именем энтомолога Л.Н.Притыкиной.

Этот вид напоминает крупными размерами тела и наличием 3

темных пятен на 5-м абдоминальном тергите P.przhevalskiji Rohd. и P.lindneri Vill., однако хорошо отличается черными ногами, отсутствием оральных хет и вздутой в большей части аристой.

Pediasiomysa przhevalskiji Rohdendorf, 1925, sec. typ.

Рохендорф, 1925:61; 1930:30. - P.pleskei Rohdendorf, 1927: 166, sec. typ., syn.n.

♂. Ширина лба на темени равна 0.37-0.40, а лица на уровне основания антенн - 0.32-0.37 ширины головы. Лобная полоска посредине лба в 1.1-1.4 раза шире орбиты, в 1.7-2.5 раза расширена кзади. 3-й членик антенн в 1.4-2.0 раза длиннее 2-го; ариста голая, вздута в базальных $1/3-2/5$ длины. Расстояние от нижнего края антенн до вибриссальных углов меньше или равно длине 3-го членика антенн. Лоб в профиль умеренно выступает, ширина скул на уровне основания антенн составляет 0.18-0.22, а высота щек - 0.07-0.12 высоты глаза. Щупики короткие, на конце умеренно вздуты. Посторбитальных щетинок один правильный ряд; внешние вертикальные щетинки хорошо развиты, немного короче внутренних. Глазковый треугольник с несколькими парами коротких черных щетинок, из них передняя более крепкая, направлена вперед и в стороны. $or\ 1 + 1-2$, они крепкие; fr в числе 11-15 пар, средней длины, в передней части лба перекрещиваются. Стороны лба, скулы, щеки и задняя часть головы снизу в коротких и тонких малозаметных желтых волосках; край рта с 6-9 парами черных щетинок, угловые вибриссы не отличаются по длине от остальных черных и крепких оральных хет. Лицо в серебристо-белом желтоватом налете, лобная полоска в более слабом серебристо-желтом налете; антенны и щупики желтые, апикальная нерасширенная часть аристы затемнена. Задняя поверхность головы светло-серая.

ac , dc и ia в числе нескольких пар, из которых только предшовные длинные и симметрично расположены. $h\ 2$, $ph\ 1$, $pa\ 1$, $sa\ 1-2$, $pa\ 2$, $mpl\ 2$, $mpl\ 4-7$, $spl\ 1 + 1$, $hpl\ 6-9$, черные. Щиток с длинными перекрещивающимися ar , крепкими lat и bas и несколькими парами неправильно расположенных волосковидных дискальных щетинок. Передние лапки без длинных щетинок или волосков; t_2 с 2-4 ad , ктенидий не развит. Костальный шип отсутствует, R_5 замкнута на крае крыла, r_1 и r_{4+5} голые. Соотношение длин 3-го и 5-го отрезков кости равно $1 : 1.41-1.70$, а 2-го и 3-го отрезков медиальной жилки - $1 : 0.31-0.43$. Изгиб m прямоили тупоугольный, без остротка; R_5 широкая; tr слабо изогнута, почти прямая, cu с очень коротким остротком. Грудь, включая плечевые бугорки, в светло-сером налете; темные продольные полосы




рис.35-38. *Pediasiomysia*, ♂.

35, 36 - *P. margiana*: 35 - голова сбоку, 36 - крыло; 37, 38 - *P. pritykinae*: 37 - голова сбоку, 38 - передняя лапка сбоку.

светло-коричневые, лапки красноватые. Крылья прозрачные, базикоста и эполет светло-коричневые, грудная чешуйка белая.

3-й тергит брюшка без крепких щетинок посредине заднего края. Гениталии небольшие. Церки равномерно клювовидно изогнуты. Брюшко в серебристо-белом налете, без просвечивающих желтых пя-