du cou et la poitrine sont d'un roux très-clair, parsemé de petites taches noirâtres sur les deux dernières parties, sur les flancs et sur les couvertures inférieures de la queue; le ventre est blanc; les pieds sont bruns: longueur totale, neuf pouces et demi. Cette *bécassine* diffère de toutes les autres en ce qu'elle a le doigt intermédiaire uni à l'extérieur par une membrane qui se prolonge jusqu'au tiers de leur longueur, et uni au doigt intérieur par une autre, mais seulement à la base.

La PETITE BÉCASSINE, *Scolopax gallinula*, Latham, pl. enl. 88 $\frac{1}{4}$, de l'*Hist. nat. de Buffon*. Cette espèce se trouve en Europe et dans le nord de l'Amérique, où elle habite les marais; elle se cache dans les roseaux des étangs, sous les joncs secs et les glaïeuls tombés au bord de l'eau. Il est très-difficile de la faire lever, il faut presque marcher dessus; ce qui lui a fait donner le nom de *sourde*. Son vol est moins rapide et plus direct que celui de la *bécassine commune*; il a moins de durée, et elle ne se remet jamais loin. Sa chair passe pour un manger plus délicat. Son bec est long d'environ quinze lignes; d'un jaune sale à la base, ensuite bleuâtre et noirâtre à la pointe; le dessus de la tête est noir, mélangé de couleur de rouille; une raie jaune passe au-dessus de l'œil; le cou est varié de blanc, de brun et de rouge pâle; les plumes des côtés du dos sont longues, soyeuses, brunes et bordées de jaune; le croupion est d'un pourpre bleuâtre brillant; le ventre blanc; les grandes plumes des ailes sont noirâtres; la queue est composée de douze plumes brunes avec une teinte jaune sur les bords; les pieds sont d'une couleur de chair verdâtre. Le plumage des deux sexes est le même. On trouve son nid dans les marais. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs oblongs, blanchâtres et semés de taches roussâtres. Cette espèce habite l'Europe et l'Amérique septentrionale.

La BÉCASSINE SAKHALINE, *Scolopax sakhalina*, Vieill., pl. 85 d'un ouvrage russe publié par Sakhalin), se trouve en Russie. Elle a le dessus de la tête, du cou, des ailes et de la queue d'un fauve rougeâtre varié d'un grand nombre de taches brunes; le tour du bec et la gorge blancs et bruns; la poitrine de cette dernière couleur, mais uniforme; les côtés du ventre, les plumes de l'anus et le bord des grandes plumes alaires blancs; le bec et les pieds bruns.

La BÉCASSINE DES SAVANES, *Scolopax paludosa*, Lath., pl. enl. de Buffon, n.º 895, a treize pouces de longueur totale, et est un quart moins grosse que la *bécasse commune*. Elle a le bec long de quatre pouces environ, rougeâtre dans les deux tiers de sa longueur, et noirâtre dans le reste. Deux bandes noires sont sur la tête et séparées sur le sommet par une couleur rousse; une troisième noirâtre est sur le *lorum*; le dessus du

NOUVEAU
DICTIONNAIRE

D'HISTOIRE NATURELLE,
APPLIQUÉE AUX ARTS,

A l'Agriculture, à l'Économie rurale et domestique,
à la Médecine, etc.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES
ET D'AGRICULTEURS.

Nouvelle Édition presque entièrement refondue et considé-
rablement augmentée ;

AVEC DES FIGURES TIRÉES DES TROIS RÈGNES DE LA NATURE.

TOME III.

DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LANOË, RUE DE LA HARPE.

A PARIS,
CHEZ DETERVILLE, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 8.

M DCCC XVI,