Литература

Блюменталь Т.И., Дольник В.Р. 1962. Оценка энергетических показателей птиц в полевых условиях. — Орнитология, 4: 394–407.

Гладков Н.А. 1954. Семейство дроздовые Turdidae. — Птицы Советского Союза. Г.П. Дементьев, Н.А. Гладков (ред.). Т. 6. М., с. 405–621.

Губарь Ю.П., Мошкин А.В. 1966. К расширению ареала синехвостки (*Tarsiger cyanurus*). — 4 межвузовская зоогеографическая конференция 1966 г. Тезисы докл. Одесса, с. 68–69.

Зимин В.Б., Ивантер Э.В. 2002. Птицы. Серия «Мир животных». Изд. 3-е, исправленное и дополненное. Петрозаводск, 288 с.

Иванов А.И. 1976. Каталог птиц Советского Союза. Л., 276 с.

Коханов В.Д. 2005. К истории распространения и характеру пребывания синехвостки *Tarsiger cyanurus* в Восточной Европе. — Русский орнитол. журн. Экспресс-выпуск, 281: 212–214.

Савинич И.Б. 1990. Зарянка — *Erithacus rubecula* (L.). — Линька воробьиных птиц Северо-Запада СССР. Л., с. 47–53.

Мальчевский А.С. Синехвостка на Кольском полуострове. — Природа, 2: 58–59.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана. Т. 2. Л., 504 с.

Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей. — Экология птиц Приладожья (Тр. Биол. научно-исследовательского ин-та ЛГУ, № 32). Л., с. 3–86.

Панов И.Н., Семашко В.Ю., Титов Н.В., Яматин П.Н. 2008. Результаты кольцевания птиц в деревне Черная Река в 2006–2008 гг. — Мат-лы научн. конф., посвященной 70-летию Беломорской биологической станции МГУ: Сборник статей. М., с. 321–324.

Робул К.П., Деметриадес К.К. 1997. Синехвостка *Tarsiger cyanurus* в окрестностях Ухты. — Русский орнитол. журн. Экспресс-выпуск, 15: 22.

Рогачева Э.В., Сыроечковский Е.Е., Черников О.А. 2008. Птицы Эвенкии и сопредельных территорий. М., 754 с.

Рябицев В.К. 2001. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, 608 с.

Сазонов С.В. 2004. Орнитофауна тайги Восточной Фенноскандии. М., 391 с.

Сотников В.Н. 1997. Синехвостка *Tarsiger cyanurus* в Кировской области. — Русский орнитол. журн. Экспресс-выпуск, 24: 17.

Степанян Л.С. 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М., 808 с.

Cramp S. (ed.). 1988. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. V. Oxford-London-New-York, 617 p.

И.Н. Панов[1], В.Ю. Семашко[2], Г.М. Тертицкий[3], А.Е. Черенков[4], Е.В. Шутова[5]

[1] Центр кольцевания птиц ИПЭЭ РАН, Ленинский просп., 86–31, Москва, 119313, Россия; e-mail: kuksha@yandex.ru

[2] Ул. Петрозаводская, 28–3–115, Москва, 125475, Россия; e-mail: simakovw@mail.ru

[3] Ин-т географии РАН, Старомонетный пер., 29, Москва, 119017, Россия; e-mail: tertitski@mail.ru

[4] Соловецкий филиал Беломорской биостанции МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Заозёрная 17–6, пос. Соловецкий, Архангельская обл., 164070, Россия; e-mail: chersol@mail.ru

[5] Кандалакшкий гос. природный заповедник, ул. Линейная, 35, Кандалакша, Мурманская обл., 184042, Россия; e-mail: ask_kand_reserve@com.mels.ru

I.N. Panov[1], V.Yu. Semashko[2], G.M. Tertitski[3], A.E. Cherenkov[4], E.V. Shutova[5]

[1] Bird Ringing Centre of Russia, Leninsky Prosp., 86–31, Moscow, 117312, Russia; e-mail: kuksha@yandex.ru

[2] Petrosavodskaya Str., 28–3–115, Moscow, 125475, Russia; e-mail: simakovw@mail.ru

[3] Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Staromonetny Per., 29, Moscow, 119017, Russia; e-mail: tertitski@mail.ru

[4] White Sea Biological Station (WSBS), Biological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Zaozernaya Str., 17–6, Solovki, Arkhangelsk Region, 164070, Russia; e-mail: chersol@mail.ru

[5] Kandalaksha State Nature Reserve, Lineinaya Str., 35, Kandalaksha, Murmansk Region, 184042, Russia; e-mail: ask_kand_reserve@com.mels.ru

Первые регистрации пеночки-зарнички и корольковой пеночки в районе Кандалакшского залива Белого моря

First records of the Pallas' Warbler (Phylloscopus inornatus) and Yellow-browed Warbler (Ph. proregulus) on the coasts of Kandalaksha Bay, the White Sea, Russia

Пеночка-зарничка (*Phylloscopus inornatus*) и **корольковая пеночка** (*Ph. proregulus*) — сибирские виды пеночек, залёты которых в последнее время всё чаще регистрируются в разных местах Европы. Западная граница областей гнездования зарнички проходит по северному

Предуралью; корольковая пеночка гнездится в тайге восточной части Западно-Сибирской равнины и восточнее (Птушенко, 1954; Рябицев, 2001). Находки птиц на территории Европы имеют место преимущественно в период осенней миграции, реже весной. Причины и механизмы залётов этих пеночек на запад до сих пор достоверно не установлены, выдвигаются различные гипотезы. Большинство авторов объясняют залёты особенностями миграционного поведения молодых особей (дисперсия, реверсивная миграция и пр.), а также особыми условиями атмосферной циркуляции в периоды появления этих видов в Европе (обзор см. Гаврилов и др., 2001 и 2006; а также Шаповал, 1987).

Несмотря на неплохую авифаунистическую изученность территорий, примыкающих к Кандалакшскому заливу Белого моря (наиболее полный обзор см. Бианки и др., 1993), сибирских пеночек здесь ранее не встречали. Регистрации этих видов южнее имеют место достаточно регулярно, благодаря массовому кольцеванию птиц в юго-восточном Приладожье (Носков и др., 1981; Зимин и др., 1993).

Первые регистрации сибирских пеночек на побережье Кандалакшского залива также связаны с кольцеванием птиц. По одной особи пеночки-зарнички были отловлены 5.09.2007 г. в окрестностях пос. Лувеньга (67°06′ с.ш., 32°42′ в.д.) и 6.09.2009 г. в дер. Чёрная река (66°31′ с.ш., 32°55′ в.д.). Первая птица определена как молодая, длина крыла 53 мм, масса тела 6.5 г, балл жирности «средне» (по Блюменталь, Дольник, 1962); возраст второй птицы определён не был (при полной или почти полной пневматизации черепа), длина крыла 57 мм, масса тела 7.2 г, балл жирности «много». Молодой самец корольковой пеночки, отловленный 10.09.2008 г. в дер. Чёрная река, имел длину крыла 55 мм, массу тела 6.3 г, балл жирности «средне». Во всех трёх случаях птицы были без признаков линьки, в свежем оперении.

Таким образом, пеночка-зарничка и корольковая пеночка — новые виды в списке залётных видов птиц побережий Кандалакшского залива Белого моря. Несмотря на то что в соседней Финляндии севернее 66° с.ш. в последние три десятилетия наблюдатели регистрируют эти два вида довольно регулярно (BirdLife Finland www.birdlife.fi, Pirkka Aalto, устн. сообщ.), описываемые нами отловы являются самыми северо-западными пунктами встреч сибирских пеночек для территории России. Таким образом, осенние залёты пеночки-зарнички и корольковой пеночки могут иметь не только западные, но и северо-западные азимуты.

Литература

Бианки В.В., Коханов В.Д., Корякин А.С., Краснов Ю.В., Панева Т.Д., Татаринкова И.П., Чемякин Р.Г., Шкляревич Ф.Н., Шутова Е.В. 1993. Птицы Кольско-Беломорского региона. — Рус. орнитол. журн., 2 (4): 491–586.

Блюменталь Т.И., Дольник В.Р. 1962. Оценка энергетических показателей птиц в полевых условиях. — Орнитология, 4: 394–407.

Гаврилов В.В., Марова И.М., Горецкая М.Я., Веселовская Е.О. 2001. Первый залёт корольковых пеночек (*Phylloscopus proregulus proregulus*) в Московскую область. — Орнитология, 29: 285–287.

Гаврилов В.В., Горецкая М.Я., Веселовская Е.О. 2006. Встреч и корольковой пеночки и пеночки-зарнички в Московской области в 1999–2005 гг. — Орнитология, 33: 164–166.

Зимин В.Б., Сазонов С.В., Лапшин Н.В., Хохлова Т.Ю., Артемьев А.В., Анненков В.Г., Яковлева М.В. 1993. Орнитофауна Карелии. Петрозаводск, 220 с.

Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей. — Экология птиц Приладожья. (Тр. Биол. науч.-исслед. ин-та, № 32). Л., с. 3–86.

Птушенко Е.С. 1954. Род пеночки *Phylloscopus*. — Птицы Советского Союза. Г.П. Дементьев, Н.А. Гладков (ред.). Т. 6. М., с. 146–210.

Рябицев В.К. 2001. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, 608 с.

Шаповал А.П. 1987. Необычное количество пеночек-зарничек осенью 1985 г. на Куршской косе Балтийского моря. — Исследования по фауне и экологии птиц Палеарктики. Л., с. 136–142.

И.Н. Панов[1], Е.В. Шутова[2]

[1] Центр кольцевания птиц ИПЭЭ РАН, Ленинский просп., 86–31, Москва, 119313, Россия; e-mail: kuksha@yandex.ru

[2] Кандалакшкий гос. природный заповедник, ул. Линейная, 35, Кандалакша, Мурманская обл., 184042, Россия; e-mail: ask_kand_reserve@com.mels.ru

I.N. Panov[1], E.V. Shutova[2]

[1] Bird Ringing Centre of Russia, Leninsky Prosp., 86–31, Moscow, 117312, Russia; e-mail: kuksha@yandex.ru

[2] Kandalaksha State Nature Reserve, Lineinaya Str., 35, Kandalaksha, Murmansk Region, 184042, Russia; e-mail: ask_kand_reserve@com.mels.ru