

Варакушка — новый зимующий вид России

Blue-throated Robin (Luscinia svecica) — the new wintering species of Russia

Варакушка (*Luscinia svecica*) — обычный гнездящийся вид России. Основные зимовки расположены в Центральной Африке и Южной Азии (Дементьев, Гладков, 1954; Рябицев, 2002; Белик и др., 2006). Самец белозвёздной морфы был обнаружен 21.01.2008 г. на территории Имеретинской низменности (Краснодарский край, окрестности г. Адлера), которая представляет собой приморскую равнину, занятую садами, полями овощных культур, пересечённую системой дренажных каналов. Имеретинская низменность является самым северным форпостом колхидских низинных болот — единственным на территории России ландшафтом подобного рода (Тильба и др., 2006). Погода в период наблюдений была ясная: нулевая облачность, температура +15°C и выше, ветер слабый. Птица кормилась в зарослях ежевики в прибрежной полосе небольшого, шириной 2–3 м, дренажного канала. Это первая зимняя встреча варакушки на территории России.

Литература

- Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба П.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернобай В.Ф. 2006. Орнитофауна Южной России; характер пребывания видов и распределение по регионам. — Стрепет, 4 (1): 5–35.
- Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.). 1954. Варакушка *Luscinia svecica* L. — Птицы Советского Союза. Т. 6. М., с. 599–609.
- Рябицев В.К. 2002. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель. Екатеринбург, 605 с.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Крутолапов В.А. 2006. Имеретинская низменность. — Водно-болотные угодья России. Т. 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа. Мищенко А.Л. (ред.). М., с. 98–108.

А.Г. Перевозов

Кавказский гос. природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, 385000, Россия; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru

A.G. Perevozov

Caucasus State Natural Biosphere Reserve, Sovetskaya Str, 187, Maykop, 385000, Russia; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru

Хрустан — новый гнездящийся вид Западного Кавказа

Common Dotterel (Eudromias morinellus) — new breeding species of Western Caucasus, Russia

Гнездовой ареал **хрустана** (*Eudromias morinellus*) состоит из ряда изолированных участков в зональных и горных тундрах Евразии (Степанян, 2003). На Большом Кавказе известно единичное гнездование в междуречье Черёка Балкарского и Черёка Безенгийского, Центральный Кавказ (Белик, Данченко, 1977). Авторами было сделано предположение о расселении этого вида на Кавказе, поскольку к тому времени его орнитофауна была достаточно подробно изучена (Радде, 1884; Богданов, 1879; Сатунин, 1912; Аверин, Насимович, 1938; Бёме, 1958) и пропуск предыдущими орнитологами такого яркого вида исключался. Данная находка и её трактовка идёт вразрез с мнением о невозможности расселения обитателей высокогорья между отдельными изолированными горными странами (Бёме, 1960). Однако, в последующие годы предположение о расселении хрустана на Кавказе не подтверждалось, несмотря на интенсификацию орнитофаунистических исследований. Хрустан на Кавказе отмечался несколько раз лишь как редкий пролётный вид (Тильба, 1999; Белик и др., 2006). В последние годы численность этого вида в Европе сокращается (BirdLife International, 2004). Для России известен только один многолетний ряд данных о динамике численности, который тоже указывает на сокращение гнездовой численности хрустана (Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991).

На плато Лагонаки, Республика Адыгея, Майкопский р-он, Биосферный полигон Кавказского заповедника, 25.06.2008 г. в 1 км от вершины г. Абадзеш (2369 м над ур. м.) на абсолютной высоте 2350 м мы наблюдали 3 хрустана. Стация, где были обнаружены птицы, представляет собой участок практически ровной альпийской пустоши с небольшим уклоном (3–5°) в северо-западном направлении. Травяной и почвенный покров на участке местами был