морников (*S. longicaudus*), 9 **средних поморников** (*S. pomarinus*). Кроме того, мы рассмотрели как минимум 2 или 3 особи (поодиночке в разных местах) **южно-полярного поморника** (*S. maccormicki*). Издали, сидя на воде, они напоминали крупных тёмных чаек. Когда поморники этого вида нападали на моевок, то широко раскрывали в полёте короткий хвост и отчётливо демонстрировали светлые основания первостепенных маховых перьев. Крупные размеры и более светлая по сравнению с исподом крыльев окраска брюшной стороны тела также не оставляли сомнений в видовой принадлежности птиц.

Затем, 17.07, погода изменилась — поднялся сильный ветер, море заштормило, и моевки с поморниками постепенно откочевали из залива.

Ранее южнополярный поморник отмечался летом на Дальнем Востоке в открытых водах Японского и Охотского морей и Тихого океана, а также у берегов Курильских о-вов, о. Сахалин, Приморского края и Магаданской обл. (Нечаев, Гамова, 2009). У берегов Камчатки вид отмечен впервые.

Литература

Нечаев В.А., Гамова Т.В. 2009. Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог). Владивосток, 564 с.

Е.Г. Лобков

Камчатский гос. технический университет (ФГОУ КамчатГТУ), ул. Ключевская, 35, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000, Россия; e-mail: lobkov48@mail.ru

E.G. Lobkov

Kamchatka State Technical University, Kluchevskaya Str., 35, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatsky Kray, 683000, Russia: e-mail: lobkov48@mail.ru

Уссурийский снегирь на острове Матуа, Курильские острова

Ussurian Grey-bellied Bullfinch (Pyrrhula griseiventris griseiventris) in the Matua Island, Kuril Islands

С 19 по 25.09.2009 г. на о. Матуа (средняя часть Курильской гряды) работала краеведческая экспедиция с Камчатки. В конце августа в лагере на юго-восточном берегу острова, где базировался отряд, среди зарослей ольхового стланика несколько дней постоянно держался выводок из 4 молодых особей **уссурийского снегиря** (*Pyrrhula griseiventris griseiventris*)**.** Одного из них, неуверенно летавшего, поймали и сфотографировали (автор фотографии И.В. Витер).

Считается (Нечаев, Гамова, 2009), что ареал вида вдоль Курильских о-вов с юга достигает о. Симушир и, быть может, островов Кетой и Ушишир. Остров Матуа — новая точка в ареале, смещающая его границы на север.

Литература

Нечаев В.А., Гамова Т.В. 2009. Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог). Владивосток, 564 с.

Е.Г. Лобков

Камчатский гос. технический университет (ФГОУ КамчатГТУ), ул. Ключевская, 35, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000, Россия; e-mail: lobkov48@mail.ru

E.G. Lobkov

Kamchatka State Technical University, Kluchevskaya Str., 35, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatsky Kray, 683000, Russia: e-mail: lobkov48@mail.ru

Первый случай гнездования белого гуся на Восточном Мурмане

First case of breeding of the Snow Goose (Chen caerulescens) on East Murman Coast, the southern Barents Sea, Russia

Основной современный ареал **белого гуся** (*Chen caerulescens*) находится в Северной Америке, на территории России этот вид гнездится на островах и побережье Восточной Сибири (Птушенко, 1952; Сыроечковский-мл., 1997; и др.). В орнитологической литературе накопилось большое число сообщений о залётах белых гусей в Западную Сибирь (Рябицев, 1998; и др.), Причерноморье (Ардамацкая, 1996; Жмуд, 1996), Болгарию (Nankinov, 1997), Дагестан