Варакушка — новый зимующий вид России
Blue-throated Robin (Luscinia svecica) — the new wintering species of Russia

Варакушка (*Luscinia svecica*) — обычный гнездящийся вид России. Основные зимовки расположены в Центральной Африке и Южной Азии (Дементьев, Гладков, 1954; Рябицев, 2002; Белик и др., 2006). Самец белозвёздной морфы был обнаружен 21.01.2008 г. на территории Имеретинской неизменности (Краснодарский край, окрестности г. Адлера), которая представляет собой приморскую равнину, занятую садами, полями овощных культур, пересечённую системой дренажных каналов. Имеретинская низменность является самым северным форпостом колхидских низинных болот — единственным на территории России ландшафтом подобного рода (Тильба и др., 2006). Погода в период наблюдений была ясная: нулевая облачность, температура +15°C и выше, ветер слабый. Птица кормилась в зарослях ежевики в прибрежной полосе небольшого, шириной 2–3 м, дренажного канала. Это первая зимняя встреча варакушки на территории России.

Литература

Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба П.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернобай В.Ф. 2006. Орнитофауна Южной России; характер пребывания видов и распределение по регионам. — Стрепет, 4 (1): 5–35.

Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.). 1954. Варакушка *Luscinia svecica* L. — Птицы Советского Союза. Т. 6. М., с. 599–609.

Рябицев В.К. 2002. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель. Екатеринбург, 605 с.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Крутолапов В.А. 2006. Имеретинская низменность. — Водно-болотные угодья России. Т. 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа. Мищенко А.Л. (ред.). М., с. 98–108.

А.Г. Перевозов

Кавказский гос. природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, 385000, Россия; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru

A.G. Perevozov

Caucasus State Natural Biosphere Reserve, Sovetskaya Str, 187, Maykop, 385000, Russia; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru

Хрустан — новый гнездящийся вид Западного Кавказа
Common Dotterel (Eudromias morinellus) — new breeding species of Western Caucasus, Russia

Гнездовой ареал **хрустана** (*Eudromias morinellus*) состоит из ряда изолированных участков в зональных и горных тундрах Евразии (Степанян, 2003). На Большом Кавказе известно единичное гнездование в междуречье Черека Балкарского и Черека Безенгийского, Центральный Кавказ (Белик, Данченко, 1977). Авторами было сделано предположение о расселении этого вида на Кавказе, поскольку к тому времени его орнитофауна была достаточно подробно изучена (Радде, 1884; Богданов, 1879; Сатунин, 1912; Аверин, Насимович, 1938; Бёме, 1958) и пропуск предыдущими орнитологами такого яркого вида исключался. Данная находка и её трактовка идёт вразрез с мнением о невозможности расселения обитателей высокогорья между отдельными изолированными горными странами (Бёме, 1960). Однако, в последующие годы предположение о расселении хрустана на Кавказе не подтверждалось, несмотря на интенсификацию орнитофаунистических исследований. Хрустан на Кавказе отмечался несколько раз лишь как редкий пролётный вид (Тильба, 1999; Белик и др., 2006). В последние годы численность этого вида в Европе сокращается (BirdLife International, 2004). Для России известен только один многолетний ряд данных о динамике численности, который тоже указывает на сокращение гнездовой численности хрустана (Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991).

На плато Лагонаки, Республика Адыгея, Майкопский р-он, Биосферный полигон Кавказского заповедника, 25.06.2008 г. в 1 км от вершины г. Абадзеш (2369 м над ур. м.) на абсолютной высоте 2350 м мы наблюдали 3 хрустанов. Стация, где были обнаружены птицы, представляет собой участок практически ровной альпийской пустоши с небольшим уклоном (3–5°) в северо-западном направлении. Травяной и почвенный покров на участке местами был

нарушен скотом. Сбитые участки составляют от 3 до 15 % проективного покрытия и заняты почвой, перемешанной с небольшими камнями. На мхи приходилось около 25% проективного покрытия; на лишайники — 50%. Доминирующие виды травянистого покрова — *Festuca ovina*, *Campanula biebersteiniana*, *Carex huetiana* и *Gentiana dshimilensis* (Акатов, 1999). Кроме того, на участке располагался небольшой снежник. Во время осмотра участка на наличие гнезда или выводка птицы проявляли беспокойство, которое выражалось в подёргивании головой, перелётах и перебежках в 5–10 м от нас и симуляцией ранения (зафиксировано с помощью видеокамеры). Степень беспокойства изменялась при нашем перемещении по участку. К сожалению, у нас не было возможности провести тщательные поиски, а беглый осмотр территории не дал результатов. Согласно критериям, рекомендованным Комитетом Европейского Орнитологического Атласа (The EBCC Atlas…, 1997), данную находку следует трактовать скорее как вероятное гнездование, чем достоверное. При этом вероятность этого гнездования, по нашему мнению, достаточно высока, поскольку хрустаны обнаружены в разгар гнездового периода в подходящем для гнездования биотопе и демонстрировали поведение, характерное для птиц, беспокоящихся возле гнезда. Таким образом, это, возможно, первая гнездовая находка хрустанов на Западном Кавказе и вторая на Большом Кавказе.

Данную находку вряд ли можно считать твёрдым доказательством расселения хрустана на Кавказе. С увеличением численности и расширением гнездового ареала этого кулика на Кавказе фаунистические находки случались бы чаще, чем раз в несколько десятилетий. Площадь подходящих для хрустана стаций (горные пустоши) на Кавказе составляет 5–8% от площади высокогорий (Шифферс, 1956), что вполне достаточно для благополучного существования популяции. Пропуск вида возможен в отдельно взятый год, но маловероятен на протяжении десятилетий. По всей видимости, хрустан на Кавказе гнездится буквально единично и неежегодно, находя подходящие условия для гнездования во время миграции.

Литература

Аверин Ю.В., Насимович А.А. 1938. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа. — Тр. Кавказского гос. заповедника. Вып. 1. М., с. 5–55.

Акатов В.В. 1999. Роль островного эффекта в формировании высокогорных фитоценозов Западного Кавказа. — Дисс. ... доктора биол. наук. Майкоп, 281 с. (с приложением 331 с.).

Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба П.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернобай В.Ф. 2006. Орнитофауна Южной России; характер пребывания видов и распределение по регионам. — Стрепет, 4 (1): 5–35.

Белик В.П., Данченко В.В. 1977. Распространение *Eudronias morinellus* (Charadriidae) на Кавказе. — Зоол. журн., 56 (5): 798–800.

Бёме Р.Л. 1958. Птицы Центрального Кавказа. — Учёные записки Северо-Осетинского педагогического ин-та. Т. 23. Вып. 1. Орджоникидзе, с. 111–183.

Бёме Р.Л. 1960. Возникновение орнитофауны высокогорных ландшафтов Кавказа. — Орнитология, 3: 331–339.

Богданов М. 1879. Птицы Кавказа. — Тр. Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском ун-те. Т. VIII. Вып. 4. Казань, 188 с.

Радде Г. 1884. Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis Caucasica). Тифлис, 451 с.

Сатунин К. А. 1912. Систематический каталог птиц Кавказского края. — Записки Кавказского отделения Императорского Русского Географического общества. Кн. 28. Ч. 2. Тифлис, с. 87–196.

Семёнов-Тян-Шанский О.И., Гилязов А.С. 1991. Птицы Лапландии. М., 288 с.

Тильба П.А. 1999. Птицы. — Флора и фауна заповедников. Вып. 81: Фауна Кавказского заповедника. М., с. 53–87.

Томкович П.С. 2007. Динамика численности хрустана: тревожные мысли на «зыбкой почве». — Информационные материалы рабочей группы по куликам, № 20: 43–45.

Шифферс Е.В. 1956. Высокогорные альпийские и субальпийские луга. — Растительный покров СССР. Пояснительный текст к Геоботанической карте СССР. Т. 2. М–Л., с. 477–495.

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and observation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation series No. 12), p. 374.

А.Г. Перевозов

Кавказский гос. природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, 385000, Россия; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru

A.G. Perevozov

Caucasus State Natural Biosphere Reserve, Sovetskaya Str, 187, Maykop, 385000, Russia; e-mail: perevozov-kgz@mail.ru