Новые виды птиц в фауне Прибитюжья, Воронежская область
New species in the bird fauna of the Bityug River area, Voronezh Region, European Russia

Обыкновенный сверчок (*Locustella naevia*) для Воронежской обл. с середины XX в. приводится как редкий пролётный и гнездящийся вид; до того он регистрировался только на пролёте (Огнев, Воробьев, 1923). При этом большинство доводов о его гнездовании до последнего времени основывались фактически на одном достоверном упоминании о встрече Н.К. Павловским в 1955 г. двух поющих самцов в пойме Дона у г. Павловска (Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; Нумеров, 1996; Венгеров, Лихацкий, 2008). Плотность обыкновенного сверчка, приведённая в Атласе гнездящихся птиц Европы (Hagemeijer, Blair, 1997) для квадратов ES1 (левобережный участок долины Дона, более 10 пар/50 км^2), FS1 (Каменная Степь, более 10 пар/50 км^2) и FS3 (Хопёрский заповедник, более 100 пар/50 км^2) дана, без всякого сомнения, ошибочно. Эти цифры, как, впрочем, и сам статус вида, совершенно безосновательны. Применительно непосредственно к Прибитюжью ни одним из исследователей данный вид не упоминался.

Нами поющий самец встречен 28.05.2009 г. в блюдцеобразной западине, расположенной на сельскохозяйственном поле в 8 км северо-западнее г. Боброва Воронежской обл. Этот участок ежегодно обследуется в весенне-летний период с 1999 г., ранее обыкновенного сверчка мы здесь не отмечали. Подходящие для данного вида биотопические условия в этом месте возникли в два последних года, когда в западине во время предшествовавших влажных лет образовались обширные куртины поросли осоки (*Carex* sp.) и другой болотно-луговой травянистой растительности, в которой и держалась наблюдавшаяся птица.

Второй самец был встречен 2.06.2009 г. на правобережном склоне в долине р. Смычок (приток р. Икорец). Птица держалась на увлажнённом, поросшем вейником (*Calamagrostis* sp.) и ракитником (*Chamaecytisus ruthenicus*) участке у выхода родника в средней части склона. Данный район также периодически посещается в течение 13 лет, но обыкновенных сверчков там тоже не отмечали.

Несмотря на довольно поздние сроки встреч, факт размножения в обоих случаях из-за отсутствия прямых доказательств можно лишь предполагать.

Канареечный вьюрок (*Serinus serinus*) впервые отмечен на территории Воронежской обл. в 1974 г. (Нумеров, 1996). За прошедшее время зарегистрированы несколько встреч выводков, а также птиц, демонстрировавших территориальное поведение. Достоверные встречи данного вида в бассейне р. Битюг до 2010 г. не известны (Соколов, 2007).

Поющий самец канареечного вьюрка встречен 25.05.2010 г. в пойме р. Битюг у юго-восточной окраины г. Боброва Воронежской обл. Птица держалась на небольшом острове, разделяющем два русла реки (новое и старое), на участке, поросшем чёрной ольхой (*Alnus glutinosa*) и белой ивой (*Salix alba*). Во время пения самец изредка перемещался по соседним деревьям, оставаясь всё время в средней части крон. В дальнейшем встречи вьюрка здесь регистрировали, по крайней мере, до 7.07.2010 г.; непосредственные признаки размножения при этом не выявлены.

На юго-западной окраине с. Старая Чигла Аннинского р-на Воронежской обл. 23.06.2010 г. встречен поющий самец **желчной овсянки** (*Emberiza bruniceps*). Птица держалась в молодой поросли ивы (*Salix* sp.) высотой 1.5–2 м на обрывистом берегу реки. Затем, вспугнутая, неоднократно перелетала по расположенному рядом лугу, садясь на отдельные выдающиеся по высоте над основной растительностью прошлогодние стебли полыни (*Artemisia* sp.), но в итоге вернулась на прежний куст ивы, на котором и была первоначально замечена. В данном случае вероятнее всего имел место дальний залёт. Эта встреча является первой достоверной регистрацией вида не только для Воронежской обл. и Черноземья, но и для сопредельных более южных регионов.

Литература

Барабаш-Никифоров И.И., Семаго Л.Л. 1963. Птицы юго-востока Чернозёмного центра. Воронеж, 210 с.

Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. 2008. Птицы. — Позвоночные животные Воронежского заповедника: аннотированный список. Т. 2. Воронеж, 76 с.

Нумеров А.Д. 1996. Класс Птицы Aves. — Природные ресурсы Воронежской области. Позвоночные животные. Кадастр. Воронеж, с. 48–159.
Огнев С.И., Воробьев К.А. 1923. Фауна наземных позвоночных Воронежской губернии. М., 225 с.
Соколов А.Ю. 2007. Птицы Бобровского Прибитюжья. — Тр. Воронежского гос. заповедника. Т. 25. Воронеж, с. 133–193.
Hagemeijer W.J., Blair M.J. (eds.). 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Theirs Distribution and Abundance. London, 903 p.

А.Ю. Соколов
ФГУ Заповедник «Белогорье», ул. Фрунзе, 68, Бобров, Воронежская обл., 397702, Россия; e-mail: falcon209@mail.ru
A.Yu. Sokolov
Nature Reserve «Belogorye», Frunze Str., 68, Bobrov, Voronezh Region, 397702; Russia; e-mail: falcon209@mail.ru

Встреча желчной овсянки в центре европейской части России
A record of the Red-headed Bunting (Granativora bruniceps) in the center of European Russia

Желчная овсянка (*Granativora bruniceps*) — птица степных и полупустынных ландшафтов Передней и Средней Азии и Казахстана. До конца XX в. крайними северо-западными пределами области обитания данного вида были оз. Эльтон и долина р. Бол. Узень (Спангенберг, Судиловская, 1954; Степанян, 1990). Между тем, для вида характерно расширение границ ареала, и уже к началу XIX в. желчная овсянка заселила южные районы саратовского Заволжья в пределах Питерского, Фёдоровского и Новоузенского районов (Завьялов, Табачишин, 2007). Каких-либо сведений о встречах желчной овсянки западнее отмеченных выше границ в доступной нам литературе не встречено.

При обследовании 7.06.2009 г. южных окраин Мордовского государственного заповедника в 0.5 км юго-западнее дер. Андреевка Темниковского р-на был встречен самец желчной овсянки.

Биотоп представляет собой расположенный в небольшом понижении вторичный суходольный злаково-разнотравный луг с отдельными крупными травами и с разбросанными по нему невысоким (0.2–2.0 м) самосевом сосны. Его площадь составляла около 3–4 га. В прошлом он частично использовался под выпас крупного рогатого скота. Луг тянется вдоль небольшого ручья, вытекающего из заболоченной и заросшей кустарником низины. По окраине проходит полевая дорога и проходит линия ЛЭП 6–10 кВт. С севера к лугу примыкало заброшенное поле, также заросшее по окраинам соснами. С юго-востока в 0.6 км находится довольно крупный лесной массив.

Птица сидела на проводах, при этом она активно пела и подпустила наблюдателя практически вплотную. Своеобразный голос можно было передать как звонкую трель «*чут-чут-чут-триуриу*». Были сделаны несколько снимков, после чего птица перелетела на 50 м и села на вершину одной из сосен. Там самец также активно пел и вновь подпустил человека на 7–10 м, а когда его спугнули, перелетел на 30–40 м и вновь запел. Подобное повторялось ещё дважды, после чего он отлетел, а наблюдение пришлось прервать. В целом складывалось впечатление, что самец придерживался своего территориально участка; самки отмечено не было.

Кроме желчной овсянки на этом лугу держались 3–4 пары **луговых чеканов** (*Saxicola rubetra*), пара **лесных коньков** (*Anthus trivialis*), пара **обыкновенных жуланов** (*Lanius collurio*) и самец **коростеля** (*Crex crex*). При повторном обследовании 5.07.2009 г. овсянки не отмечены. Данная регистрация является, вероятно, первым зафиксированным фактом залёта желчной овсянки в центр европейской части России примерно на 500 км от известной северо-западной границы ареала.

Литература

Спангенберг Е.П., Судиловская А.М. 1954. Желчная овсянка *Emberiza bruniceps* Brandt. — Птицы Советского Союза. Г.П. Дементьев, А.Н. Гладков (ред.). Т. 5. М., с. 400–406.
Степанян Л.С. 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. М., 728 с.