

*О гнездовании пёстрого дрозда в Приуралье и на Урале**About breeding of the White's Thrush (Zoothera varia) on the Ural Mountains and in the area to the west*

Границы распространения **пёстрого дрозда** (*Zoothera varia*) в уральской части ареала до сих пор остаются неясными (Рябицев, 2008; Сотников, 2008). По мнению Н.Н. Данилова (1960, 2003), пёстрый дрозд вселился на Урал позднее других сибирских иммигрантов и на рубеже XIX и XX вв. был необычайно редок, а в последующие годы появился в значительном количестве. Ещё менее изучено кружево гнездового ареала этого вида. Пение самцов или встречи особей в гнездовое время зарегистрированы от Приполярного и Северного Урала до Приуралья и Южного Урала (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; Теплова, 1957; Данилов, 1960 (2003); Остроумов, 1972; Хазиева и др., 1975; Шураков и др., 1989; Багаутдинова, 2000, 2003; Нейфельд, Теплов, 2000; Алексеева, 2002; Иванов, Погребной, 2002; Кузьмич, 2002; Селиванова, Естафьев, 2003; Шепель и др., 2004; Захаров, 2006; Рябицев и др., 2006; Тарасов и др., 2006; Валуев и др., 2007; Матвеева и др., 2007; Поляков, 2007; Селиванова, 2007; Марова и др., 2008; и др.). На западных пределах распространения пёстрый дрозд встречен на территории Удмуртии (Меньшиков и др., 2000) и в Кировской обл. (Сотников, 2002, 2008; Кондрухова, 2003). На территории Волжско-Камского заповедника в Раифских лесах Татарстана предполагают существование изолированного поселения (Сотников, 2008, по сообщениям В.Г. Ивлева и А.С. Аюпова).

Данные о находках гнёзд или обнаружении слётков в регионе немногочисленны, и каждая находка представляет определённый интерес. Наиболее западным районом гнездового ареала пёстрого дрозда являются окрестности д. Большой Билиб в восточной Удмуртии, где 5.07.2007 г. был обнаружен плохо летающий слёт (Пятак, 2007). На Северном и Среднем Урале пёстрый дрозд достоверно гнездится. В Печоро-Илычском заповеднике в конце июля 2001 г. найдены 2 гнезда, покинутых птенцами, возможно прошлогодних (Бойко, Кузнецова, 2002). В заповеднике «Вишерский» слётков встречали в июле в окрестностях хребта Чувальский Камень (Шепель и др., 2004) и в поймах рек Вишеры и Малой Мойвы (Колбин, 2005). В заповеднике «Денежкин Камень» обнаружены несколько десятков гнёзд (Бойко, 2001). О находках 4 выводков в 1948 г. в Висимском заповеднике на территории площадью примерно 100 км<sup>2</sup> писал Н.Н. Данилов, 1960 (2003). Есть сообщения, без указания подробностей, об их гнездовании в Висимском заповеднике (Ларин, 1998) и в Невьянском р-не Свердловской обл. (Коровин, Суслова, 2005). На Южном Урале слётки отмечены в Челябинской обл. в окрестностях г. Миасса на хребте Малый Урал (Захаров, 1989; цит. по: Захаров, 2006). В Башкирском заповеднике слётка пёстрого дрозда 4.07.1966 г. встретил А.А. Ткаченко (1971).

Основные сведения по гнездовой биологии этого вида собраны Г.В. Бойко (2001) на Северном Урале в Ивдельском и Североуральском р-нах Свердловской обл., Берёзовском р-не Тюменской обл., Красновишерском р-оне Пермской обл. и на территории заповедника «Денежкин Камень» (60°30' с.ш., 59°40' в.д.). По этим данным, основанным на осмотре примерно 35 гнёзд, пёстрый дрозд предпочитает биотопы, расположенные в верхней зоне тайги на границе с горным криволесьем. Гнездится в сырых участках смешанного леса, используя для постройки гнёзд берёзу и сосну, реже лиственницу, ель, кедр, иву. Гнёзда устраивает обычно в крупных развилках ствола в нижней или средней части крон на высоте от 2.5 до 15.5 м, но преимущественно от 4 до 12 м. Из особенностей строения всех осмотренных гнёзд Г.В. Бойко (2001) отмечает использование сухой хвои кедра для выстилки лотка.

Нами в окрестностях пос. Мыс Чусовского р-на Пермского края (58°36' с.ш., 57°25' в.д.), примерно в 220 км южнее заповедника «Денежкин Камень», были найдены 2 гнезда пёстрого дрозда в условиях южной тайги и низкогорного рельефа (около 200 м над ур. м.). Первое гнездо было обнаружено 2.06.2007 г. в долине р. Усьвы в верхней части гряды на склоне южной экспозиции в смешанном лесу с преобладанием ели и пихты (Кузиков, 2007). Второе — 3.06.2009 г. в 50 м от первого. Оба гнезда, в отличие от найденных на Северном Урале, размещались на стволах сухих поваленных елей, лежавших на склоне под углом 15–30° к горизонтали, в промежутке между торчащими вверх сучьями. Высота расположения гнёзд над землёй составляла

2.6 и 2.4 м, соответственно. В связи с тем, что найденные гнёзда по строению несколько отличаются от гнёзд, описанных в литературе (Воробьев, 1954; Ильяшенко, 1982; Бойко, 2001), приводим их подробное описание.

Первое гнездо представляло собой массивную постройку диаметром  $30 \times 28$  см. В составе наружного слоя преобладали тонкие веточки берёзы и ели с примесью сухих листьев осины, зелёного мха, лишайника и папоротника. Толщина наружного слоя 3–5 см. Внутренний слой (2–2.5 см) состоял из стеблей и тонких корешков трав. Лоток был выстлан стеблями трав и листьями осины. В лотке лежало несколько хвоинок пихты, которые, впрочем, могли попасть в гнездо случайно. Диаметр лотка 12.5 см, глубина 8.5 см. Различная высота стенок гнезда (от 6.5 до 10 см) обеспечивала горизонтальное положение лотка с учётом наклона дерева. В момент обнаружения гнезда в нём находились 2 яйца, которые к 6.06 исчезли.

Второе гнездо состояло из массивной рыхлой основы в виде подушки из зелёного мха размером  $32 \times 20$  см (наружный слой) и внутренней части ( $20 \times 16$  см), построенной из тонких веточек берёзы и ели, а также стеблей травянистых растений, обмазанных глиной. Толщина внутренней стенки от 2 до 4 см. Лоток был выстлан стеблями трав, в нём, как и в первом гнезде, отсутствовала выстилка из хвои кедра (в ближайших окрестностях гнезда встречались единичные кедровые деревья). Диаметр лотка  $10 \times 13$  см, глубина 7 см. Максимальная высота гнезда 10.5 см. Взрослая птица, крепко сидевшая в гнезде, не была видна со стороны склона. При подходе к гнезду на 2–3 м она слетела и, оставаясь незаметной, стала издавать кричащие звуки. В гнезде была найдена полная кладка из 5 свежих яиц. Их размеры (мм) и масса (в скобках, г):  $34.82 \times 24.15$  (10.32);  $34.55 \times 23.52$  (9.79);  $35.79 \times 24.42$  (10.89);  $35.83 \times 22.84$  (9.56) и  $35.67 \times 24.33$  (10.95). Скорлупа 4 яиц была окрашена в песочный серовато-охристый цвет с едва заметным светло-бурым крапом, у одного фон имел голубоватый оттенок, на котором пятна и крапинки были более заметны.

Сравнивая расположение и устройство найденных нами гнёзд с имеющимися описаниями гнёзд с Северного Урала (Бойко, 2001), можно отметить, что, кроме места расположения гнёзд, основной их особенностью является отсутствие кедровой хвои в выстилке лотка. На наличие длинноиглой хвои в лотке, кроме Северного Урала, указывают авторы, описавшие строение гнёзд пёстрого дрозда в других частях ареала: в Японии — хвои сосны (Ян, 1952, цит. по: Гладков, 1954), в Зейском заповеднике — хвои кедрового стланика в одном из двух гнёзд, обнаруженном на высоте 1000 м над ур. м. (Ильяшенко, 1982). Использование игл для выстилки лотка встречается у пёстрых дроздов в тех местах гнездования, где широко распространены хвойные виды деревьев, на что указывал Н.А. Гладков (1954). Возможно, использование сухой хвои служит для увеличения теплоизолирующих свойств гнезда и связано с высотой местности. В пользу последнего предположения свидетельствуют находки гнёзд без выстилки из хвои, сделанные на небольшой абсолютной высоте (Воробьев, 1954; Ильяшенко, 1982; наши данные).

### Литература

- Алексеева Н.С. 2002. К фауне птиц Шалинского района Свердловской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 5–9.
- Багаутдинова З.Т. 2000. Новые данные о фауне птиц Башкирского заповедника. — Там же, с. 5.
- Багаутдинова З.Т. 2003. Птицы Башкирского заповедника. — Там же, с. 8–26.
- Бойко Г.В. 2001. Гнездовая биология пёстрого дрозда на Северном Урале. — Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат-лы Международной конф. (XI Орнитологическая конф.) Казань, с. 102–103.
- Бойко Г.В., Кузнецова И.А. 2002. К фауне птиц Печоро-Илычского заповедника и прилегающих территорий. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 56–57.
- Валуев В.А., Полежанкина П.Г., Алексеев В.Н. 2007. Дополнение к редким видам птиц Башкортостана. — Там же, с. 33–35.
- Воробьев К.А. 1954. Птицы Уссурийского края. М.: 360 с.
- Воронцов Е.М. 1949. Птицы Камского Приуралья (Молотовской области). Горький: 114 с.
- Гладков Н.А. 1954. Семейство Дроздовые *Turdidae*. — Птицы Советского Союза. Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.). Т. 6. М., с. 405–621.
- Данилов Н.Н. 1960. Орнитофауна Среднего Урала и Зауралья и история ее формирования. — Тр. проблемного и тематического совещ. Зоологического ин-та АН СССР. Т. 9, с. 73–80. [повторная публикация: Данилов Н.Н. 2003. — Русский орнитол. журн., Экспресс-выпуск, 12 (210): 89–97].

- Захаров В.Д. 2006. Птицы Южного Урала (видовой состав, распространение, численность). Екатеринбург, Миасс, 228 с.
- Иванов С.А., Погребной И.П. 2002. К фауне птиц окрестностей Верхней Салды. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 129–131.
- Ильяшенко В.Ю. 1982. К биологии пестрого дрозда. — Орнитология, 17: 183–184.
- Колбин В.А. 2005. Авифауна заповедника «Вишерский». — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 124–140.
- Кондрухова С.В. 2003. Встреча пёстрого дрозда в Кировской области. — Там же, с. 123.
- Коровин В.А., Сулова Т.А. 2005. Птицы бассейна реки Большой Чёрной (Средний Урал). — Там же, с. 140–154.
- Кузиков И.В. 2007. Авифаунистические наблюдения и находки сезона 2007 года в окрестностях посёлка Мыс (Пермский край). — Там же, с. 137–144.
- Кузьмич А.А. 2002. К орнитофауне севера Челябинской области. — Там же, с. 149–152.
- Ларин Е.Г. 1998. Редкие виды птиц Свердловской области на территории природного комплекса Висимского заповедника. — Там же, с. 119–121.
- Марова И.М., Иваницкий В.В., Фёдоров В.А., Алексеев В.Н., Шипилина Д.А. 2008. К фауне птиц западного макросклона горно-лесной части Южного Урала. — Там же, с. 62–69.
- Матвеева Г.К., Петухов А.В., Бобырь И.Г., Павленко Н.А. 2007. Материалы по распространению редких птиц на территории Чердынского района Пермского края. — Там же, с. 191–194.
- Меньшиков А.Г., Матанцев В.А., Тюлькин Ю.А., Зыкин А.В., Иванов Н.И., Суров Э.В., Пятак Л.П. 2000. Новые сведения по некоторым видам птиц в Удмуртии. — Там же, с. 131–132.
- Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. 2000. Птицы юго-восточной части Республики Коми. — Там же, с. 132–154.
- Остроумов Н.А. 1972. Животный мир Коми АССР. Позвоночные. Сыктывкар, 280 с.
- Поляков В.Е. 2007. Заметки к орнитофауне лесостепной зоны Зауралья. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 198–207.
- Пятак Л.П. 2007. Факт гнездования пестрого дрозда в Удмуртии. — Там же, с. 207–208.
- Рябицев В.К. 2008. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Справочник-определитель. 3-е изд. Екатеринбург, 634 с.
- Рябицев В.К., Ляхов А.Г., Коршиков Л.В. 2006. К фауне птиц северо-запада Челябинской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 176–184.
- Селиванова Н.П. 2007. К распространению пёстрого дрозда на Урале. — Там же, с. 221.
- Селиванова Н.П., Естафьев А.А. 2003. К фауне птиц Приполярного Урала. — Там же, с. 161–164.
- Сотников В.Н. 2002. Орнитологические находки в Кировской области в 2000–2001 годах. — Русский орнитол. журн. Экспресс-выпуск, 176, с. 143–146.
- Сотников В.Н. 2008. Птицы Кировской области и сопредельных территорий. Т. 2. Воробьинообразные. Ч. 2. Киров, 432 с.
- Тарасов В.В., Поляков В.Е., Давыдов А.Ю. 2006. К фауне птиц лесостепного северо-востока Челябинской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 205–218.
- Теплова Е.Н. 1957. Птицы района Печоро-Илычского заповедника. — Тр. Печоро-Илычского гос. заповедника. Вып. 6. Сыктывкар, с. 5–115.
- Ткаченко А.А. 1971. Дополнения к списку позвоночных Башкирского заповедника. — Сб. трудов Башкирского гос. заповедника. Вып. 3. М., с. 125–131.
- Ушков С.А. 1927. Список птиц Пермского округа Уральской области. — Бюлл. МОИП. Отд. биол., 36 (1–2): 68–107.
- Хазиева С.М., Болотников А.М., Каменский Ю.Н., Никольская В.И. 1975. Материалы о гнездящихся птицах правобережья реки Камы Добрянского района Пермской области. — Гнездовая жизнь птиц. Пермь, с. 117–127.
- Шепель А.И., Зиновьев Е.А., Фишер С.В., Казаков В.П. 2004. Животный мир Вишерского края. Позвоночные животные. Пермь, 208 с.
- Шураков А.И., Воронов Г.А., Каменский Ю.Н. (составители). 1989. Животный мир Прикамья. — Пермь, 193 с.

**И.В. Кузиков**

Научно-исследовательский ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, ул. Гамалеи, 18, Москва, 123098, Россия; e-mail: kuzikov-y@mail.ru

**I.V. Kuzikov**

The Gamaleja Institute for Epidemiology and Microbiology, Academy of Medicine Sciences, Gamaleja Str., 18, Moscow, 123098, Russia; e-mail: kuzikov-y@mail.ru

### **Гнездование болотной совы на территории Верхнего Дона**

### **Breeding of the Short-eared Owl (*Asio flammeus*) in the upper Don River area, European Russia**

**Болотная сова (*Asio flammeus*)** — малочисленный пролётный, гнездящийся и кочующий зимой вид Липецкой обл. (Климов и др., 2004). В сводке «Кладки и размеры яиц птиц бассей-