АВИФАУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ / FAUNISTIC NOTES

Соловьиный сверчок в Ярославском Поволжье
The Savi's Warbler (Locustella luscinioides) in the Yaroslavl Region, European Russia

Считается, что соловьиный сверчок (*Locustella luscinioides*) имеет южное происхождение и представляет собой теплолюбивый вид, склонный к восстановлению единой области обитания, существовавшей со времени окончания последнего оледенения (Симкин, 1990). Во второй половине XX века в Восточной Европе отчётливо наметилась тенденция к постепенному расселению соловьиного сверчка в северо-восточном направлении. К настоящему времени он обнаружен во многих районах Нечернозёмного центра России, в том числе и на территориях, сопредельных с Ярославским Поволжьем, где ранее данный вид не отмечался на протяжении всего периода орнитологических исследований (Сабанеев, 1868; Кузнецов, Макковеева, 1959; Голубев, 1999; Зайцев, 2006).

Нами 31.05 и 1.06.2004 г. с использованием лодки обследована часть береговой линии, акватории и ряд островов озера Неро Ростовского р-на Ярославской обл. Маршрут пролегал вдоль побережья озера от г. Ростова Великого на северо-восток до истока р. Вексы и далее вдоль восточного берега до южной оконечности водоёма. Южная часть озера обследована от его восточных участков до устья р. Сары. Общая протяжённость маршрута составила 21 км. Впервые песня соловьиного сверчка отмечена вечером 31.05 в окрестностях населённого пункта Воржа, примерно через 1.5 км встречен второй поющий самец, основная концентрация сверчков была выявлена на «сарском мысу», который глубоко вдаётся в акваторию озера, и на островах в его окрестностях.

Сверчки держались в топких, труднопроходимых тростниковых зарослях с куртинами ивняка и вкраплениями осоковников, окаймляющих юго-восточную часть водоёма на промежутке от устья р. Сары до пос. Борисовское. Отдельные самцы пели в тростниковых куртинах среди открытой воды, расположенных в 100–200 м от берега. Песню соловьиного сверчка можно было слышать круглые сутки, но наибольшая вокальная активность приходилась на сумеречные и предрассветные часы. Один из самцов пел с заката до рассвета практически всю ночь. В дневное время суток соловьиный сверчок поёт вяло, продолжительность его песен невелика и составляет всего 1–3 сек., а перерывы между песнями могут достигать нескольких минут и более. В сумеречное и предрассветное время интервал между песнями сокращался до 1–5 сек., а длительность непрерывного пения значительно увеличивалась. С одного пункта наблюдения можно было слышать от 1 до 3 поющих самцов. В целом, при обследовании 12 км участка побережья, где держались соловьиные сверчки, в 2004 г. удалось отметить 14 поющих самцов. На том же отрезке побережья оз. Неро 2–5.06.2009 г. пели уже 48 самцов. Следовательно, численность поющих самцов за истекшие годы выросла не менее чем в 3 раза. Распределение птиц по побережью и прибрежным островкам оказалось неравномерным. Максимальная концентрация птиц отмечена в устье р. Сары с её островками, где условия обитания для соловьиного сверчка наиболее благоприятны. Ввиду труднодоступности мест обитания сверчков, гнездование этого вида установить не удалось, хотя вероятность его очень высока.

Кроме оз. Неро, соловьиные сверчки обнаружены в Заволжском р-не г. Ярославля. Один поющий самец отмечен 29.04.2011 г. в зарослях тростника на значительном по площади затопленном торфяном карьере, расположенном между торговым центром «Глобус» и заводом «Машприбор». Видимо эту же птицу удалось подманить 30.04 на запись его видовой песни и детально рассмотреть. Птицу слышали в том же месте 3, 8 и 9.05, после этого наблюдения в данном месте не проводили. Ещё один соловьиный сверчок обнаружен по пению 3 и 9.05.2011 г. на заросшем тростником торфяном карьере в окрестностях завода «Машприбор» (Ляпинские карьеры, окраина Ярославля). При детальном обследовании Ляпинских карьеров 1 и 9.05 других особей мы не отметили. Наконец, 8.05.2011 г. поющий соловьиный сверчок отмечен

в тростниковых крепях среди двух небольших озёр естественного происхождения, расположенных между ул. Сахарова и ул. Красноборская в Ярославле; в течение всего мая пение этого сверчка слышали многократно. Расстояние между тремя поющими самцами соловьиного сверчка в Ярославле (ул. Сахарова, торговый центр «Глобус», завод «Машприбор») по прямой составляло от 900 до 1300 м.

Встреча сразу трёх поющих самцов соловьиного сверчка в Ярославле в 2011 г. может свидетельствовать о недавнем появлении вида в этих местах и о расселении птиц по центральной части Верхневолжья в северо-восточном направлении.

Соловьиный сверчок проник на территорию Ярославского Поволжья, видимо, совсем недавно. Высокая требовательность к гнездовым стациям (Птушенко, 1954) и неравномерность их размещения по территории Ярославского Поволжья обуславливает пятнистый характер распространения этого вида в регионе. Все факты встреч соловьиного сверчка, которыми мы располагаем к настоящему времени, убеждают нас в том, что число птиц, ежегодно посещающих рассматриваемую территорию в гнездовой период, может исчисляться сотнями особей. Динамика численности поющих самцов, основанная на данных учётов этого вида в 2004 и 2009 гг., указывает на стремительный рост группировки соловьиного сверчка озера Неро и на то, что плотность населения этого вида птиц вероятно ещё не достигла предельных показателей. Учитывая то обстоятельство, что нами не была обследована береговая линия запада и юго-запада «ростовской» котловины, где на пространстве от «сарского мыса» до пос. Песочное есть подходящие для обитания этого вида места, общее число территориальных самцов на оз. Неро можно оценить в 100–150 особей.

Несмотря на отсутствие фактов обнаружения гнёзд и птенцов, высокая концентрация поющих самцов соловьиного сверчка в устье р. Сары позволяет нам предполагать, что он, вне всякого сомнения, гнездится в данном месте. Таким образом, современный статус соловьиного сверчка в Ярославском Поволжье можно определить следующим образом, — это предположительно гнездящийся, спорадично распространённый, расселяющийся, перелётный вид региона. Расселение соловьиного сверчка происходит по естественным причинам, и в особых мерах охраны в Ярославском Поволжье он не нуждается.

Авторы благодарят К.К. Панченко, который принимал участие в орнитологическом обследовании котловины озера Неро в 2004 г.

Литература

Голубев С.В. 1999. Современное состояние авифауны Ярославской области и некоторые тенденции её изменений за последние 150 лет. — Биологические ресурсы, их состояние и использование в бассейне Верхней Волги. В.П. Семерной (ред.). Ярославль, с. 230–250.

Зайцев В.А. 2006. Позвоночные животные северо-востока Центрального региона России. (Виды фауны, численность и ее изменения). М., 513 с.

Кузнецов Н.В., Макковеева И.И. 1959. Животный мир Ярославской области. Ярославль, 226 с.

Птушенко Е.С. 1954. Соловьиный сверчок (*Locustella luscinioides* Savi). — Птицы Советского Союза. Т. 6. Г.П. Дементьев, Н.А. Гладков (ред.). М., с. 267–271.

Сабанеев Л.П. 1868. Материалы для фауны Ярославской губернии. — Труды Ярославского губернского стат. комитета. Вып. IV. Ярославль, с. 239–285.

Симкин Г.Н. 1990. Певчие птицы: справочное пособие. М., 339 с.

С.В. Голубев[1], В.А. Симонов, А.А. Русинов

[1]Факультет биологии и экологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, ул. Матросова, 9, г. Ярославль, 150057, Россия; e-mail: gol_arctic@mail.ru, aleksrusynov@rambler.ru

S.V. Golubev[1], V.A. Simonov, A.A. Rusinov

[1]P.G. Demidov Yaroslavl State University, Biological Faculty, Matrosov Str., 9, Yaroslavl, 150057, Russia; e-mail: gol_arctic@mail.ru, aleksrusynov@rambler.ru

Серый сорокопут и белая лазоревка на севере Московской области

Great Gray Shrike (Lanius excubitor) and Azur Tit (Parus cyanus) in the north of Moscow region

Серый сорокопут (*Lanius excubitor*) и **белая лазоревка**, или князёк (*Parus cyanus*), занесены в Красную книгу Московской области (2008), а гнездящиеся в области подвиды *L. e.*